

0.2

Inequalities and Absolute Values

equation

$$2x + 1 = 5$$

$$2x = 4$$

$$x = 2$$

Inequalities

$$2x + 1 < 5$$

الحداثة كد تكد
Interval

$$2x + 1 < 5$$

$$2x < 4$$

$$x < 2$$

الحداثة كد تكد
Interval

Interval Notation

$$\{x : 5 \leq x\}$$

x هيت ان x اكبر
او تساوي 5

$$\{x : 1 < x < 5\}$$



$$(1, 5)$$

$$\{x : 1 \leq x \leq 5\}$$




$$[1, 5]$$

$$\{x : 1 \leq x < 5\}$$



$$[1, 5)$$

$$x < 1$$



$$(-\infty, 1)$$

$$x \geq 5$$



$$[5, \infty)$$

هذا متباينة

* هذا متباينة هو لقد صممت لمعادلة الخطين الا في حالة العزب
او المتبني عدد صلب قلبه اشارة

$$-2x + 1 \geq 10$$

$$\frac{-2x}{-2} \geq \frac{9}{-2}$$

$$x \leq -4.5$$

$$0 \leq x+3 \leq 6$$

$$-3 \leq x \leq 3$$




EXAMPLE 1 Solve the inequality $2x - 7 < 4x - 2$ and show the graph of its solution set.

$$2x - 7 < 4x - 2$$

$$2x - 4x < -2 + 7$$

$$\frac{-2x}{-2} < \frac{5}{-2}$$

$$x > -2.5$$



EXAMPLE 2 Solve $-5 \leq 2x + 6 < 4$.

$$-5 \leq 2x + 6 < 4$$

$$-5 - 6 \leq 2x < 4 - 6$$

$$\frac{-11}{2} \leq \frac{2x}{2} < \frac{-2}{2}$$

$$-5.5 \leq x < -1$$

بالنصف 2

$$[-5.5, -1)$$



EXAMPLE 3Solve the quadratic inequality $x^2 - x < 6$.

① تحليل للمعادلة التربيعية

$$x^2 - x - 6 < 0$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$


$$(x - 3)(x + 2) = 0$$

$x = 3$ $x = -2$

$$(x - 3)(x + 2) < 0$$

② صاعد غزب الحدين
يجب ان يكون سالب

③ نرسم الحدين
نضع صف الاعداد
واقبت / الاجابة
test point



الحل هو الفترة سالب $(-2, 3)$

EXAMPLE 4Solve $3x^2 - x - 2 > 0$.


$$(3x + 2)(x - 1) > 0$$

صاعد غزب الحدين
يجب ان يكون موجب

$$3x + 2 = 0$$

$$3x = -2$$

$$x = -\frac{2}{3}$$




الحل $(1, \infty) \cup (-\infty, -\frac{2}{3})$

EXAMPLE 5

Solve $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$.

منطقة المحل يجب ان تكون صفا و موجب



مترات الكل

$$(-\infty, -2) \cup [1, \infty)$$

يجب استثناء الحالة التي يكون فيها المقام 0

$$x+2=0$$

$$x = -2$$

حذف $x = -2$ كل

Absolute Value

القيمة المطلقة

$$|5| = 5$$

$$|-5| = 5$$

حذف القيمة المطلقة

$$* |ab| = |a||b| \Rightarrow |3x| = |3||x| = 3|x|$$

$$* \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \Rightarrow \left| \frac{-4}{b} \right| = \frac{|-4|}{|b|} = \frac{4}{|b|}$$

$$* |a+b| \leq |a| + |b| \quad |-3+5| ? | -3| + |5|$$
$$2 \leq 3 + 5$$

$$* |a-b| \geq ||a| - |b|| \quad |5-3| ? 5 - 3$$
$$2 \geq 2$$

ملاحظة

$$|x| < a \iff -a < x < a$$

$$|x| < 5 \iff -5 < x < 5$$



$$|x| > a \iff x < -a \quad x > a$$



EXAMPLE 8 Solve the inequality $|x - 4| < 2$ and show the solution set on the real line. Interpret the absolute value as a distance.

$$|x - 4| < 2 \iff -2 < x - 4 < 2$$

$$-2 + 4 < x < 2 + 4$$

$$2 < x < 6 \quad (2, 6)$$



EXAMPLE 9 Solve the inequality $|3x - 5| \geq 1$ and show its solution set on the real line.

$$|3x - 5| \geq 1$$

$$3x - 5 \leq -1 \quad \text{or} \quad 3x - 5 \geq 1$$

$$3x \leq -1 + 5$$

$$3x \geq 6$$

$$3x \leq 4$$

$$x \geq \frac{6}{3}$$

$$x \leq \frac{4}{3}$$

$$\text{or} \quad x \geq 2$$



$$(-\infty, \frac{4}{3}] \cup [2, \infty)$$

EXAMPLE 13Solve $x^2 - 2x - 4 \leq 0$.نبحث عن الفترة التي تكون فيها $x^2 - 2x - 4 \leq 0$

$$x^2 - 2x - 4 = 0 \quad a = 1 \quad b = -2 \quad c = -4$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-2) \pm \sqrt{4 - (4 \times 1 \times -4)}}{2}$$

$$\sqrt{5} = 2.1$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{20}}{2} = \frac{2}{2} \pm \frac{\sqrt{4 \times 5}}{2}$$

$$1 + \sqrt{5} \approx 3.1$$

$$x = 1 \pm \sqrt{5}$$

$$1 - \sqrt{5} \approx -1.1$$



$$[1 - \sqrt{5}, 1 + \sqrt{5}]$$

Problem Set 0.2

1. Show each of the following intervals on the real line.

(a) $[-1, 1]$

(b) $(-4, 1]$

(c) $(-4, 1)$

(d) $[1, 4]$

(e) $[-1, \infty)$

(f) $(-\infty, 0]$

In each of Problems 3–26, express the solution set of the given inequality in interval notation and sketch its graph.


3. $x - 7 < 2x - 5$

4. $3x - 5 < 4x - 6$

$$-7 + 5 < 2x - x$$

$$-2 < x$$

$$x > -2$$



11. $x^2 + 2x - 12 < 0$

12. $x^2 - 5x - 6 > 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \times 1 \times (-12)}}{2 \times 1} = \frac{-2 \pm \sqrt{52}}{2}$$

$$x = -1 \pm \frac{\sqrt{52}}{2} = -1 \pm \frac{\sqrt{13} \sqrt{4}}{2} = -1 \pm \sqrt{13}$$



$$(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$$

13. $2x^2 + 5x - 3 > 0$

14. $4x^2 - 5x - 6 < 0$

15. $\frac{x+4}{x-3} \leq 0$

16. $\frac{3x-2}{x-1} \geq 0$

17. $\frac{2}{x} < 5$

18. $\frac{7}{4x} \leq 7$

13) $2x^2 + 5x - 3 > 0$

$$(2x - 1)(x + 3) > 0$$

$$2x - 1 = 0$$

$$2x = 1$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$x + 3 = 0$$

$$x = -3$$



$$(-\infty, -3) \cup (\frac{1}{2}, \infty)$$

17) $\frac{2}{x} < 5$


لغزب بـ x

$$2 < 5x$$

$$5x > 2$$

$$x > \frac{2}{5}$$

$$x - \frac{2}{5} > 0$$



$$(\frac{2}{5}, \infty)$$

21. $(x + 2)(x - 1)(x - 3) > 0$

22. $(2x + 3)(3x - 1)(x - 2) < 0$

23. $(2x - 3)(x - 1)^2(x - 3) \geq 0$

24. $(2x - 3)(x - 1)^2(x - 3) > 0$

25. $x^3 - 5x^2 - 6x < 0$

26. $x^3 - x^2 - x + 1 > 0$


21) $(x + 2)(x - 1)(x - 3) > 0$

$x + 2 = 0$
 $x = -2$

$x - 1 = 0$
 $x = 1$

$x - 3 = 0$
 $x = 3$

$(-2, 1) \cup (3, \infty)$



25) $x^3 - 5x^2 - 6x < 0$

$x(x^2 - 5x - 6) < 0$


$x(x + 1)(x - 6) < 0$

$x = 0$

$x = -1$

$x = 6$

$(-\infty, -1) \cup (0, 6)$



In Problems 35–44, find the solution sets of the given inequalities.

35. $|x - 2| \geq 5$

36. $|x + 2| < 1$

37. $|4x + 5| \leq 10$

38. $|2x - 1| > 2$

39. $\left| \frac{2x}{7} - 5 \right| \geq 7$

40. $\left| \frac{x}{4} + 1 \right| < 1$

$$\frac{2x}{7} - 5 \leq -7$$

$$\frac{2x}{7} - 5 \geq 7$$


$$\frac{2x}{7} \leq -2$$

$$\frac{2x}{7} \geq 12$$

$$x \leq -\frac{2 \times 7}{2}$$

$$x \geq 42$$


$$x \leq -7$$



$$(-\infty, -7] \cup [42, \infty)$$

0.3

The Rectangular Coordinate System



(Distance)

المسافة بين نقطتين



$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

أمثلة

EXAMPLE 1 Find the distance between

(a) $P(-2, 3)$ and $Q(4, -1)$
 $x_1 \ y_1 \quad x_2 \ y_2$


(b) $P(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ and $Q(\pi, \pi)$
 $x_1 \ y_1 \quad x_2 \ y_2$

$$a) \quad d = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (-1 - 3)^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52}$$

$$b) \quad d = \sqrt{(\pi - \sqrt{2})^2 + (\pi - \sqrt{3})^2} = 2.23$$

The equation of circle

معادله الدائرة



$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$


$$(x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 16$$

$$h = 2$$

$$k = -2$$

$$r = \sqrt{16} = 4$$

المعادلة



EXAMPLE 2 Find the standard equation of a circle of radius 5 and center (1, -5). Also find the y-coordinates of the two points on this circle with x-coordinate 2.

h k

اكتب معادلته القياسية

(1, -5)

$r=5$

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

$$(x-1)^2 + (y+5)^2 = 25$$

نقوض فيه $x=2$ ونجيب قيم y

$$(2-1)^2 + (y+5)^2 = 25$$


$$1 + (y+5)^2 = 25$$

$$\sqrt{(y+5)^2} = \sqrt{24}$$

$$y+5 = \pm\sqrt{24}$$

$$y = \pm\sqrt{24} - 5$$

$$y = \pm 2\sqrt{6} - 5$$



EXAMPLE 3 Show that the equation

$$x^2 - 2x + y^2 + 6y = -6$$

represents a circle, and find its center and radius.


$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

$$\begin{aligned} & \underbrace{x^2 - 2x + 1}_{\left(\frac{b}{2}\right)^2} + \underbrace{y^2 + 6y + 9}_{\left(\frac{b}{2}\right)^2} = -6 + 1 + 9 \\ & (x-1)^2 + (y+3)^2 = 4 \end{aligned}$$

$$h=1$$

$$k=-3$$

$$r=2$$



معادله خط
Equation of the line

$$y = mx + b$$

slope

y intercept
مقطع y

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

فرق y / فرق x = ابعدي
slope



$$y = 2x + 1$$

معادله الخط المستقيم

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

نقطة

$$x_1, y_1 \\ (3, 2)$$

$$x_2, y_2 \\ (8, 4)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 - 2}{8 - 3} = \frac{2}{5} = 2.5$$

$$y - y_1 = 2.5(x - x_1)$$

$$y - 2 = 2.5(x - 3)$$

EXAMPLES

Find an equation of the line through $(-4, 2)$ and $(6, -1)$.

اعتب معادله الخط

$$x_1, y_1 \\ (-4, 2)$$

$$x_2, y_2 \\ (6, -1)$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-1 - 2}{6 - (-4)} = \frac{-3}{10}$$

$$y - 2 = -\frac{3}{10}(x + 4)$$

✓ دائماً اكتب m هو العدد المجهول x $y =$ عند المعادله

$$y = 3x + 5$$

$$m = 3$$

$$\frac{2y}{2} = \frac{10x}{2} - \frac{2}{2}$$


$$y = 5x - 1$$

$$m = 5$$

ای خطین متوازی (Parallel) کیون

لہا نفد فیہ اعلیٰ $m_1 = m_2$

ای خطین متعامدین (Perpendicular) کیون



$$\frac{1}{\text{مید اول}} = - \frac{1}{\text{مید ثانی}}$$

$$m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

EXAMPLE 6 Find the equation of the line through $(6, 8)$ that is parallel to the line with equation $3x - 5y = 11$.

متوازی

حساب مید خط (m_1)

$$3x - 5y = 11$$

$$y = \frac{3x}{-5} + \frac{11}{-5}$$


$$m_1 = \frac{3}{5}$$

مید $m_2 = \frac{3}{5}$ میر بالنفس $(6, 8)$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 8 = \frac{3}{5}(x - 6)$$

EXAMPLE 7 Find the equation of the line through the point of intersection of the lines with equations $3x + 4y = 8$ and $6x - 10y = 7$ that is perpendicular to the first of these two lines (Figure 16).



$$y - y_1 = m_1(x - x_1)$$

$$-\frac{1}{m_1} = m_2 \text{ لكي يكون}$$

$$3x + 4y = 8$$

$$y = -\frac{3}{4}x + 2$$

$$m_1 = -\frac{3}{4}$$

$$m_2 = \frac{4}{3}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - \frac{1}{2} = \frac{4}{3}(x - 2)$$

نريد معادله الخطين كتاب نقطة التقاط

$$\begin{array}{r} (3x + 4y = 8) \quad \times -2 \\ 6x - 10y = 7 \\ \hline -6x - 8y = -16 \end{array}$$

$$-18y = -9$$

$$y = \frac{-9}{-18} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$3x + 4\left(\frac{1}{2}\right) = 8$$

$$3x = 6$$


$$\boxed{x = 2}$$

Problem Set 0.3

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

In Problems 11–16, find the equation of the circle satisfying the given conditions.

11. Center $(\overset{h}{1}, \overset{k}{1})$, radius $\overset{r}{1}$ $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$
12. Center $(-2, 3)$, radius 4
13. Center $(\overset{h}{2}, \overset{k}{-1})$, goes through $(5, 3)$



$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(5-2)^2 + (3-(-1))^2}$$

$$r = d = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 25$$

In Problems 17–22, find the center and radius of the circle with the given equation.

17. $x^2 + 2x + 10 + y^2 - 6y - 10 = 0$

$$\left(\frac{10}{2}\right)^2$$

$$\underbrace{x^2 + 2x + 1}_{\left(\frac{10}{2}\right)^2} + \underbrace{y^2 - 6y + 9}_{\left(\frac{-6}{2}\right)^2} = 10 - 10 + 1 + 9$$

$$(x+1)^2 + (y-3)^2 = 10$$

$$\text{Centre } (-1, 3) \quad r = \sqrt{10}$$

In Problems 23–28, find the slope of the line containing the given two points.

23. (1, 1) and (2, 2)

24. (3, 5) and (4, 7)

25. (2, 3) and (−5, −6)

26. (2, −4) and (0, −6)

27. (3, 0) and (0, 5)

28. (−6, 0) and (0, 6)

32) $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2-1}{2-1} = 1$

25) $m = \frac{-6-3}{-5-2} = \frac{9}{7}$

In Problems 29–34, find an equation for each line. Then write your answer in the form $Ax + By + C = 0$.

29. Through (2, 2) with slope −1

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 2 = -1(x - 2)$$

$$y - 2 = -x + 2 \quad \checkmark$$

$$y = -x + 4 \quad \checkmark \quad y + x - 4 = 0 \quad \checkmark$$

33. Through (2, 3) and (4, 8)

34. Through (4, 1) and (8, 2)

In Problems 35–38, find the slope and y-intercept of each line.

35. $3y = -2x + 1$

36. $-4y = 5x - 6$

33) $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{8-3}{4-2} = \frac{5}{2}$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 3 = \frac{5}{2}(x - 2)$$

$$2y - 6 = 6x - 10$$

$$2y - 6x + 4 = 0$$

In Problems 35–38, find the slope and y-intercept of each line. $y = mx + \textcircled{b}$
 35. $3y = -2x + 1$ 36. $-4y = 5x - 6$

35) $3y = -2x + 1$

$$y = -\frac{2}{3}x + \textcircled{\frac{1}{3}}$$

$$y \text{ intercept} = \frac{1}{3}$$

ملاحظة

يمكن حساب b بتعويض $x=0$

39. Write an equation for the line through $(x_1, y_1) = (3, -3)$ that is
- (a) parallel to the line $y = 2x + 5$;
 - (b) perpendicular to the line $y = \textcircled{2}x + 5$;
 - (c) parallel to the line $2x + 3y = 6$;
 - (d) perpendicular to the line $2x + 3y = 6$;

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y + 3 = m_1(x - 3)$$

a) $m_2 = m_1 = 2$

$$y + 3 = 2(x - 3)$$

b) $m_1 = -\frac{1}{m_2} = -\frac{1}{2}$

$$y + 3 = -\frac{1}{2}(x - 3)$$

$$c) \quad 2x + 3y = 6$$

$$y = \frac{6}{3} - \frac{2x}{3} \quad m = -\frac{2}{3}$$

$$y + 3 = -\frac{2}{3} (x - 3)$$


$$d) \quad y = \frac{6}{3} - \frac{2}{3}x \quad m_2 = -\frac{2}{3}$$

$$m_1 = \frac{3}{2}$$

$$y + 3 = \frac{3}{2} (x - 3)$$

0.5

Functions and Their Graphs



$$y = f(x)$$


$$y = 3x + 10$$

↓ جالزة
↓ عمدة التنا

$$x=1 \quad y=3+10=13$$

$$x=2 \quad y=6+10=16$$

$$x=10 \quad y=30+10=40$$



EXAMPLE 1 For $f(x) = x^2 - 2x$, find and simplify

(a) $f(4)$

(b) $f(4+h)$

(c) $f(4+h) - f(4)$

(d) $[f(4+h) - f(4)]/h$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

a) $f(4) = 4^2 - 2(4) = 16 - 8 = 8$

b) $f(4+h) = (4+h)^2 - 2(4+h)$
 $= 16 + 8h + h^2 - 8 - 2h$
 $= h^2 + 6h + 8$

c) $f(4+h) - f(4) = h^2 + 6h + 8 - 8 = h^2 + 6h$

d) $\frac{f(4+h) - f(4)}{h} = \frac{h^2 + 6h}{h} = \frac{h(h+6)}{h} = h+6$

كيفية كتابة المجال لعدد من الدوال

① إذا كانت الدالة كثيرة حدود

مثلا $f(x) = x^5 + 4x^3 - 2x + 1$
المجال واحد هو $(-\infty, \infty)$ كل الأعداد $\mathbb{R}$

② الدالة الكسرية تكون المجال هو كل الأعداد الحقيقية ما عدا أصفاء المقام

$$f(x) = \frac{3}{x+5} \quad x+5=0 \quad x=-5$$

المجال هو كل الأعداد ما عدا -5 $\mathbb{R} - \{-5\}$

③ في حالة الدالة الجذرية يجب أن يكون ما داخل الجذر أكبر أو صفر $0 \leq$ ما داخل الجذر

$$f(x) = \sqrt{x-2} \quad x-2 \geq 0 \quad x \geq 2 \quad [2, \infty)$$

④ دالة جذرية وكسرية يجب أن يكون ما داخل الجذر أكبر من صفر ولا يساوي صفر

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}} \quad x-2 > 0 \quad x > 2 \quad (2, \infty)$$

EXAMPLE 2

Find the natural domains for

(a) $f(x) = 1/(x - 3)$

(b) $g(t) = \sqrt{9 - t^2}$

(c) $h(w) = 1/\sqrt{9 - w^2}$

a) $f(x) = \frac{1}{x-3}$ $x-3=0$ $x=3$

$\{x : x \neq 3\}$ جميع الاعداد ما عدا $x=3$

b) $g(t) = \sqrt{9 - t^2}$ $9 - t^2 \geq 0$

$9 \geq t^2$ $3 \geq |t|$

$|t| \leq 3 \implies -3 \leq t \leq 3$
 $[-3, 3]$

c) $h(w) = \frac{1}{\sqrt{9 - w^2}}$

$9 - w^2 > 0$ $9 > w^2$


$3 > |w|$ $|w| < 3$

$-3 < w < 3$ $(-3, 3)$

Graphs of the functions

$$y = mx + b$$

الدالة الخطية



$$m = \text{سلبي}$$




$$m = \text{موجب}$$


∩ ∪

الدالة التربيعية


$$y = x^2$$



$$y = x^2 + 2$$




$$y = x^2 - 1$$



$$y = (x+2)^2$$



$$y = (x-2)^2 - 1$$




$$y = \frac{1}{x}$$




دالة كسرية

$$y = \frac{1}{x} + 2$$




$$y = \frac{1}{x+2}$$




EXAMPLE 4

Sketch the graphs of

(a) $f(x) = x^2 - 2$



الدالة الزوجية والفردي even odd function



الدالة الزوجية $\iff$ اذا عوضنا x و $(-x)$ في المعادلة
 $f(x) = f(-x)$ نكافئ الاصلية

الدالة الفردي $\iff$ اذا عوضنا x و $-x$ يكون نفس الجواب
 لكن مختلف بالاضحة $f(x) = -f(-x)$

خبر دو ان كنز كدور
 اذا كانت كل اعداد زوجية او اعداد ثابتة $\iff$ even
 اذا كانت كل اعداد فردي

$$f(x) = x^4 + 2x^2 + 5$$

كل اعداد زوجية
 even

$$f(x) = x^5 + x^3 + x$$

كل اعداد فردي
 odd

EXAMPLE 5

Is $f(x) = \frac{x^3 + 3x}{x^4 - 3x^2 + 4}$ even, odd, or neither?
زوجية فردية زوجية و فردية

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x}{x^4 - 3x^2 + 4}$$

$$f(-x) = \frac{(-x)^3 + 3(-x)}{(-x)^4 + 3(-x)^2 + 4} = \frac{-x^3 - 3x}{x^4 + 3x^2 + 4}$$

$$= - \left[\frac{x^3 + 3x}{x^4 + 3x^2 + 4} \right]$$

$$f(-x) = -f(x) \quad \text{odd function}$$

الدالة فردية

Problem Set 0.5

9. For $f(x) = 2x^2 - 1$, find and simplify $[f(a+h) - f(a)]/h$.

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f(a+h) = 2(a+h)^2 - 1 = 2(a^2 + 2ah + h^2) - 1 \\ = 2a^2 + 4ah + h^2 - 1$$

$$f(a) = 2a^2 - 1$$

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\cancel{2a^2} + 4ah + \cancel{h^2} - 1 - \cancel{2a^2} + 1}{h}$$

$$= \frac{4ah + h^2}{h} = \cancel{h}(4a + \cancel{h}) = 4a + h$$

13. Find the natural domain for each of the following.

(a) $F(z) = \sqrt{2z+3}$

(b) $g(v) = 1/(4v-1)$

(c) $\psi(x) = \sqrt{x^2-9}$

(d) $H(y) = -\sqrt{625-y^4}$

a) $f(z) = \sqrt{2z+3}$

$$2z+3 \geq 0$$

$$z \geq -\frac{3}{2}$$

$$\left[-\frac{3}{2}, \infty\right)$$



b) $g(v) = \frac{1}{4v-1}$

$$4v-1=0$$

$$v = \frac{1}{4}$$

$$\{v : v \neq \frac{1}{4}\}$$

$$v \neq \frac{1}{4} : v \in \mathbb{R}$$

c) $\psi(x) = \sqrt{x^2-9}$

$$x^2-9 \geq 0$$

$$x^2 \geq 9$$

$$|x| \geq 3$$



$$(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$$

d) $H(y) = \sqrt{625 - y^4}$

$$625 - y^4 \geq 0$$

$$625 \geq y^4$$

$$\sqrt[4]{y^4} \leq \sqrt[4]{625} \quad |y| \leq 5$$

$$[-5, 5]$$

$$\{y \in \mathbb{R} : -5 \leq y \leq 5\}$$

In Problems 15–30, specify whether the given function is even, odd, or neither, and then sketch its graph.

15. $f(x) = -4$

16. $f(x) = 3x$

17. $F(x) = 2x + 1$

18. $F(x) = 3x - \sqrt{2}$


19. $g(x) = 3x^2 + 2x - 1$

20. $g(u) = \frac{u^3}{8}$

21. $g(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

22. $\phi(z) = \frac{2z + 1}{z - 1}$

15) $f(x) = -4$ even



17) $f(x) = 2x + 1$ Neither even nor odd
 $f(-x) = -2x + 1$ ✓ $f(x) \neq f(-x)$ and $f(x) \neq -f(-x)$

$$y = mx + b$$




$$21) \quad g(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$$

$$g(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 - 1} = -\frac{x}{x^2 - 1}$$

$$f(x) = -f(-x)$$

odd

x	0	1	-1	2	-2	3	-3
g(x)	0	∞	∞	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{2}$



0.6

Operations
on Functions

Sums, Differences, Products, Quotients, and Powers


Consider functions f and g with formulas

$$f(x) = \frac{x-3}{2}, \quad g(x) = \sqrt{x}$$

Consider functions

العمليات للدالة الجبرية تكون
تقاطع، كالمثلث في حالة
المجموع والفرق والغرب

$$(f+g)(x) = \frac{x-3}{2} + \sqrt{x} \quad [0, \infty)$$



Formula	Domain
$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \frac{x-3}{2} + \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = \frac{x-3}{2} - \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \frac{x-3}{2} \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x-3}{2\sqrt{x}}$	$(0, \infty)$

في حالة النسبة

$$\frac{f}{g}(x) = \frac{\frac{x-3}{2}}{\sqrt{x}} = \frac{x-3}{2\sqrt{x}} \quad [0, \infty)$$

في حالة النسبة في
حالة النسبة هو نفس

العمليات في حالة المجموع لكن
نستثنى منه الصفر، الحاصل

$$\sqrt{x}^2 = 0^2$$

$$x = 0$$


الاصابة (0, infinity) لا عدد 1 صفر

$$(0, \infty)$$

EXAMPLE 1 Let $F(x) = \sqrt[4]{x+1}$ and $G(x) = \sqrt{9-x^2}$, with respective natural domains $[-1, \infty)$ and $[-3, 3]$. Find formulas for $F+G$, $F-G$, $F \cdot G$, F/G , and F^5 and give their natural domains.

$$(F+G)(x) = \sqrt[4]{x+1} + \sqrt{9-x^2}$$

$$\text{domain } [-1, 3]$$



$$(F-G)(x) = \sqrt[4]{x+1} - \sqrt{9-x^2} \quad [-1, 3]$$

$$(F \cdot G)(x) = \sqrt[4]{x+1} \sqrt{9-x^2} \quad [-1, 3]$$

$$\frac{F}{G}(x) = \frac{\sqrt[4]{x+1}}{\sqrt{9-x^2}} \quad [-1, 3)$$

$$\sqrt{9-x^2} = 0$$

$$9-x^2 = 0$$

$$9 = x^2$$

$$\sqrt{9} = x$$

$$\pm 3 = x$$

نجدت عن اصفاء الكفام

$$F^5(x) = \left(\sqrt[4]{x+1}\right)^5 = (x+1)^{5/4}$$

$$\text{domain } [-1, \infty)$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{x-3}{2}\right) = \sqrt{\frac{x-3}{2}}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = \frac{\sqrt{x}-3}{2}$$

Composition of function

$$g \circ f(x) = g(f(x)) \quad \text{نغوض } f \text{ داف } g$$

$$f \circ g(x) = f(g(x)) \quad \text{نغوض } g \text{ داف } f$$

$$f(x) = \frac{x-3}{2}$$

$$g(x) = \sqrt{x}$$

$$g \circ f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{2}}$$

$$f \circ g(x) = \frac{\sqrt{x}-3}{2}$$

EXAMPLE 2 Let $f(x) = 6x/(x^2 - 9)$ and $g(x) = \sqrt{3x}$, with their natural domains. First, find $(f \circ g)(12)$; then find $(f \circ g)(x)$ and give its domain.

SOLUTION

$$(f \circ g)(12) = f(g(12)) = f(\sqrt{36}) = f(6) = \frac{6 \cdot 6}{6^2 - 9} = \frac{4}{3}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{3x}) = \frac{6\sqrt{3x}}{(\sqrt{3x})^2 - 9}$$

$$f(x) = \frac{6x}{x^2 - 9}$$

$$g(x) = \sqrt{3x}$$


$$\neq \quad g(12) = \sqrt{3(12)} = \sqrt{36} = 6 \quad f(6) = \frac{6 \cdot 6}{6^2 - 9} = \frac{36}{27} = \frac{4}{3}$$

$$* f \circ g(x) = \frac{6\sqrt{3x}}{(\sqrt{3x})^2 - 9} = \frac{6\sqrt{3x}}{3x - 9}$$

حساب مجال الدالة المركبة
لعب التركيب يتم تصاعدياً من مجال الدالة الأولى

$$\frac{6\sqrt{3x}}{3x - 9}$$

$$3x \geq 0 \quad x \geq 0$$



$$3x - 9 = 0 \quad x = 3$$

$$[0, 3) \cup (3, \infty)$$

المجال

EXAMPLE 3

Write the function $p(x) = (x + 2)^5$ as a composite function

$g \circ f$.

$$p(x) = (x + 2)^5$$

$$g(x) = (x + 2)$$

$$f(x) = x^5$$

$$f \circ g(x) = (x + 2)^5$$




Figure 7




Figure 8

EXAMPLE 4


Sketch the graph of $g(x) = \sqrt{x+3} + 1$ by first graphing $f(x) = \sqrt{x}$ and then making appropriate translations.

دالة الجذر


$$f(x) = \sqrt{x}$$

x	f(x)
0	0
4	2
9	3
16	4

دالة الجذر x معرفة فقط
على الأعداد الموجبة $[0, \infty)$



$$\sqrt{x}$$



$$\sqrt{x+1}$$



$$\sqrt{x-3}$$



$$\sqrt{x-1}$$



$$\sqrt{x+2}$$



$$\sqrt{x+2} - 4$$

Problem Set 0.6

1. For $f(x) = x + 3$ and $g(x) = x^2$, find each value (if possible).

(a) $(f + g)(2)$

(b) $(f \cdot g)(0)$

(c) $(g/f)(3)$

(d) $(f \circ g)(1)$

(e) $(g \circ f)(1)$

(f) $(g \circ f)(-8)$

$$\begin{aligned} \text{a) } (f+g)(2) &= f(2) + g(2) \\ &= 5 + 4 = 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } (f \cdot g)(0) &= f(0) \cdot g(0) \\ &= 3 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$


$$\text{c) } \left(\frac{g}{f}\right)(3) = \frac{g(3)}{f(3)} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } f \circ g(1) &\Rightarrow g(1) = 1 \\ &\quad f(1) = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } g \circ f(1) &\quad f(1) = 4 \\ &\quad g(4) = 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } g \circ f(-8) &\quad f(-8) = 5 \\ &\quad g(5) = 25 \end{aligned}$$

15. Sketch the graph of $f(x) = \sqrt{x-2} - 3$ by first sketching $g(x) = \sqrt{x}$ and then translating. (See Example 4.)



11. Find f and g so that $F = g \circ f$. (See Example 3.)

(a) $F(x) = \sqrt{x+7}$

(b) $F(x) = (x^2 + x)^{15}$

a)

$$f(x) = x + 7$$

$$g(x) = \sqrt{x}$$

$$g \circ f(x)$$


b)

$$f(x) = x^2 + x$$

$$g(x) = x^{15}$$

0.7

Trigonometric Functions



$$\sin t = \frac{a}{c}$$

$$\cos t = \frac{b}{c}$$

$$\tan t = \frac{a}{b}$$

$$\csc t = \frac{1}{\sin t}$$

$$\sec t = \frac{1}{\cos t}$$

$$\cot t = \frac{1}{\tan t}$$

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$$

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

$$\sin(-t) = -\sin(t) \quad \text{odd function}$$

$$\cos(-t) = \cos t \quad \text{even function}$$

$$\sin t = \sin(t + 2\pi)$$

$$\cos t = \cos(t + 2\pi)$$

EXAMPLE 5

Show that tangent is an odd function.

SOLUTION

$$\tan(-t) = \frac{\sin(-t)}{\cos(-t)} = \frac{-\sin t}{\cos t} = -\tan t$$

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$$

$$\tan(-t) = \frac{\sin(-t)}{\cos(-t)} = -\frac{\sin t}{\cos t} = -\tan t$$

odd function

EXAMPLE 6

Verify that the following are identities.

$$1 + \tan^2 t = \sec^2 t \quad 1 + \cot^2 t = \csc^2 t$$

$$a) \quad 1 + \tan^2 t = \sec^2 t$$

$$\frac{\cos^2 t}{\cos^2 t} \times 1 + \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} = \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos^2 t} = \frac{1}{\cos^2 t}$$

$$\text{نفس النتيجة} = \sec^2 t$$

$$b) \quad 1 + \cot^2 t = \csc^2 t$$

$$\cot t = \frac{\cos t}{\sin t}$$

$$1 + \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t}$$

$$\frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\sin^2 t} = \frac{1}{\sin^2 t} = \csc^2 t$$

نفس النتيجة

Then

$$\sin \theta = \frac{y}{r}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r}$$

List of Important Identities We will not take space to verify all the following identities. We simply assert their truth and suggest that most of them will be needed somewhere in this book.

Trigonometric Identities The following are true for all x and y , provided that both sides are defined at the chosen x and y .

Odd-even identities

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\tan(-x) = -\tan x$$

Cofunction identities

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$$

Pythagorean identities

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Addition identities

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

Double-angle identities

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\begin{aligned}\cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= 2 \cos^2 x - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2 x\end{aligned}$$

Half-angle identities

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$$

Sum identities

$$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right)$$

Product identities

$$\sin x \sin y = -\frac{1}{2}[\cos(x + y) - \cos(x - y)]$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x + y) + \cos(x - y)]$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x + y) + \sin(x - y)]$$

Problem Set 0.7

9. Evaluate without using a calculator.

(a) $\tan \frac{\pi}{6}$


(b) $\sec \pi$

(c) $\sec \frac{3\pi}{4}$

(d) $\csc \frac{\pi}{2}$

(e) $\cot \frac{\pi}{4}$

(f) $\tan \left(-\frac{\pi}{4} \right)$



t	$\sin t$	$\cos t$
0	0	1
$\pi/6$ 30	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
$\pi/4$ 45	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
$\pi/3$ 60	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
$\pi/2$	1	0
$2\pi/3$ 120	$\sqrt{3}/2$	$-1/2$
$3\pi/4$ 135	$\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$
$5\pi/6$ 150	$1/2$	$-\sqrt{3}/2$
π	0	-1

$$a) \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{\cos \frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$b) \sec(\pi) = \frac{1}{\cos \pi} = \frac{1}{-1} = -1 \quad 2 = \sqrt{2}\sqrt{2}$$

$$c) \sec \frac{3\pi}{4} = \frac{1}{\cos(\frac{3\pi}{4})} = \frac{1}{-\frac{\sqrt{2}}{2}} = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

$$d) \csc \frac{\pi}{2} = \frac{1}{\sin(\frac{\pi}{2})} = \frac{1}{1} = 1$$

$$e) \cot\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\cos \frac{\pi}{4}}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1$$

$$f) \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\tan \frac{\pi}{4} = -\frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\cos \frac{\pi}{4}} = -1$$

11. Verify that the following are identities (see Example 6).

$$(a) (1 + \sin z)(1 - \sin z) = \frac{1}{\sec^2 z}$$

$$(b) (\sec t - 1)(\sec t + 1) = \tan^2 t$$

$$(c) \sec t - \sin t \tan t = \cos t$$

$$(d) \frac{\sec^2 t - 1}{\sec^2 t} = \sin^2 t$$

$$(a+b)(a-b)$$

$$a) (1 + \sin z)(1 - \sin z) = \frac{1}{\sec^2 z}$$

$$= 1 - \sin^2 z$$

$$= \cos^2 z$$

$$= \frac{1}{\sec^2 z}$$

$$\cos^2 z + \sin^2 z = 1$$

$$\cos^2 z = 1 - \sin^2 z$$

$$\sin^2 z = 1 - \cos^2 z$$

$$b) (\sec t - 1)(\sec t + 1) = \tan^2 t$$

$$= \sec^2 t - 1$$

$$= \tan^2 t$$



$$c) \sec t - \sin t \tan t = \cos t$$

$$\frac{1}{\cos t} - \sin t \frac{\sin t}{\cos t}$$

$$\frac{1}{\cos t} - \frac{\sin^2 t}{\cos t}$$

$$\frac{1 - \sin^2 t}{\cos t} = \frac{\cos^2 t}{\cos t} = \cos t$$

$$d) \frac{\sec^2 t - 1}{\sec^2 t} = \sin^2 t$$

$$\frac{\tan^2 t}{\sec^2 t} = \frac{\frac{\sin^2 t}{\cancel{\cos^2 t}}}{\frac{1}{\cancel{\cos^2 t}}} = \sin^2 t$$

Find the exact values in Problems 27–31. Hint: Half-angle identities may be helpful.

27. $\cos^2 \frac{\pi}{3}$

28. $\sin^2 \frac{\pi}{6}$

29. $\sin^3 \frac{\pi}{6}$

30. $\cos^2 \frac{\pi}{12}$

$$27) \left(\cos \frac{\pi}{3} \right)^2 = \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$29) \left(\sin \frac{\pi}{6} \right)^3 = \left(\frac{1}{2} \right)^3 = \frac{1}{8}$$


CHAPTER

1

Limits

1.1

Introduction to Limits



عندما x تقترب من 2
تقترب $f(x)$ من 5

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$$

نكتب النهاية بالتعريف الجاهزة
في الدالة

$$f(x) = 3x - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 1) = 8$$

$$y = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$$



$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \frac{1 - 1}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)}$$

$$1 + 1 + 1 = 3$$

x	$y = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$
1.25	3.813
1.1	3.301
1.01	3.003
1.001	3.000
1.000	3.000
0.999	2.997
0.99	2.993
0.9	2.729
0.75	2.343

Table of values



$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

$$f(x) = L$$

إذا أنتج من تقويم العبارة عدد L
 فإنه جاري فيه النهاية لكن إذا كانت الاطراف $\frac{0}{0}$
 فإن النهاية تحتاج التحليل

EXAMPLE 1 Find $\lim_{x \rightarrow 3} (4x - 5) = 4(3) - 5 = 7$

EXAMPLE 2 Find $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$.

نفوض لتقويم مباشر

$$\frac{(3)^2 - 3 - 6}{3 - 3} = \frac{0}{0}$$

لا ينتج تقويم مباشر
 يجب تحليل الدالة
 للتحليل نقوم

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 2)}{(x - 3)}$$


الآن نفوض

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x - 2) = 1$$

EXAMPLE 5 (No limit at a jump) Find $\lim_{x \rightarrow 2} [x]$.

SOLUTION Recall that $[x]$ denotes the greatest integer less than or equal to x (see Section 0.5). The graph of $y = [x]$ is shown in Figure 7. For all numbers x less than 2 but near 2, $[x] = 1$, but for all numbers x greater than 2 but near 2, $[x] = 2$. Is $[x]$ near a single number L when x is near 2? No. No matter what number we propose for L , there will be x 's arbitrarily close to 2 on one side or the other, where $[x]$ differs from L by at least $\frac{1}{2}$. Our conclusion is that $\lim_{x \rightarrow 2} [x]$ does not exist. If you check back, you will see that we have not claimed that every limit we can write must exist. ■

دالة منقطع



$$f(x) = [x] = [2] = 2$$


$$[3.1] = 3$$

$$[2.9] = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \text{not exist}$$



left hand limit
 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4$

Right hand limit

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \text{not exist}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$$

إذا لم يتساوى النهايتن إذا النهايتن غير موجودة
 إذا تساوت النهايتن فان النهايتن موجودة

Problem Set 1.1

In Problems 1–6, find the indicated limit.

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (x - 5)$

2. $\lim_{t \rightarrow -1} (1 - 2t)$

3. $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + 2x - 1)$

4. $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + 2t - 1)$

5. $\lim_{t \rightarrow -1} (t^2 - 1)$

6. $\lim_{t \rightarrow -1} (t^2 - x^2)$

1) $\lim_{x \rightarrow 3} (x - 5) = 3 - 5 = -2$

3) $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + 2x - 1)$
 $= (-2)^2 + 2(-2) - 1 = -1$

In Problems 7–18, find the indicated limit. In most cases, it will be wise to do some algebra first (see Example 2).

7. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

8. $\lim_{t \rightarrow -7} \frac{t^2 + 4t - 21}{t + 7}$

9. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{x + 1}$

10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + 2x^3 - x^2}{x^2}$

11. $\lim_{x \rightarrow -t} \frac{x^2 - t^2}{x + t}$

12. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

7) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{0}{0}$

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(\cancel{x-2})}{\cancel{x-2}}$

$\lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$

8) $\lim_{t \rightarrow -7} \frac{t^2 + 4t - 21}{t + 7} = \frac{49 - 28 - 21}{-7 + 7} = \frac{0}{0}$

$\lim_{t \rightarrow -7} \frac{(t+7)(t-3)}{t+7} = \lim_{t \rightarrow -7} (t-3) = -10$

11) $\lim_{x \rightarrow -t} \frac{x^2 - t^2}{x + t} = \frac{0}{0}$

$\lim_{x \rightarrow -t} \frac{(x+t)(x-t)}{x+t} = \lim_{x \rightarrow -t} x - t = -t - t = -2t$

43. Find each of the following limits or state that it does not exist.

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x-1}$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x-1} = \frac{|0-1|}{0-1} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x-1|}{x-1} = \frac{|2-1|}{2-1} = \frac{1}{1} = +1$$

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$ does not exist

b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x-1} = -1$

1.3

Limit Theorems

Theorem A Main Limit Theorem

Let n be a positive integer, k be a constant, and f and g be functions that have limits at c . Then

$$1. \lim_{x \rightarrow c} k = k; \quad \lim_{x \rightarrow 2} 5 = 5$$

$$2. \lim_{x \rightarrow c} x = c; \quad \lim_{x \rightarrow 2} x = 2$$

$$3. \lim_{x \rightarrow c} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow c} f(x); \quad \lim_{x \rightarrow 3} 5x = 5 \lim_{x \rightarrow 3} x = 15$$

$$4. \lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x);$$

$$5. \lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x);$$

$$6. \lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x);$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} p(x) + q(x) = \lim_{x \rightarrow 3} p(x) + \lim_{x \rightarrow 3} q(x)$$

$$7. \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}, \text{ provided } \lim_{x \rightarrow c} g(x) \neq 0;$$

$$8. \lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right]^n; \quad \lim_{x \rightarrow 2} (2x+4)^5 = \left(\lim_{x \rightarrow 2} 2x+4 \right)^5$$

$$9. \lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}, \text{ provided } \lim_{x \rightarrow c} f(x) > 0 \text{ when } n \text{ is even.}$$

EXAMPLE 1

Find $\lim_{x \rightarrow 3} 2x^4$.

$$2 \lim_{x \rightarrow 3} x^4 = 2(3)^4 = 162$$

EXAMPLE 2 Find $\lim_{x \rightarrow 4} (3x^2 - 2x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 4} 3x^2 - \lim_{x \rightarrow 4} 2x$$

$$3(4)^2 - 2(4) = 48 - 8 = 40$$

EXAMPLE 3 Find $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{x}$.

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x^2 + 9}}{\lim_{x \rightarrow 4} x} = \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 4} (x^2 + 9)}}{\lim_{x \rightarrow 4} x}$$

$$\frac{\sqrt{16 + 9}}{4} = \frac{5}{4}$$

EXAMPLE 4 If $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 4$ and $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 8$, find

$$\lim_{x \rightarrow 3} [f^2(x) \cdot \sqrt[3]{g(x)}]$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f^2(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt[3]{g(x)}$$

$$\left(\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \right)^2 \cdot \sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow 3} g(x)}$$

$$(4)^2 \cdot \sqrt[3]{8}$$

$$16 \cdot 2 = 32$$

EXAMPLE 5

Find $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{7x^5 - 10x^4 - 13x + 6}{3x^2 - 6x - 8}$.

$$\frac{7(2)^5 - 10(2)^4 - 13(2) + 6}{3(2)^2 - 6(2) - 8}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 32 \\ \hline 224 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 224 \\ 180 \\ \hline 44 \end{array}$$

$$\frac{7(32) - 10(16) - 13(2) + 6}{12 - 12 - 8} = \frac{44}{-8} = -\frac{11}{2}$$

$$(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$$

$$(A \pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2$$

$$A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$$

EXAMPLE 6

Find $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 3x + 7}{x^2 - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 3x + 7}{(x-1)^2}$.

$$\frac{(1)^3 + 3(1) + 7}{1^2 - 2(1) + 1} = \frac{1 + 3 + 7}{1 - 2 + 1} = \frac{11}{0}$$

النهاية غير موجودة

EXAMPLE 7

Find $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \frac{1-1}{\sqrt{1}-1} = \frac{0}{0}$ ✓

بجهد صفرية
التسطير

نقوم بالتطهير والتعويض بمرافقة الجذور

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x-1)}(\sqrt{x}+1)}{\cancel{x-1}} = 2$$

EXAMPLE 8Find $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 + x - 6}$.

$$= \frac{4 + 6 - 10}{4 + 2 - 6} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 5)}{(x - 2)(x + 3)} = \frac{7}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Squeeze theorem

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad f(x) < g(x) < h(x) \quad \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

EXAMPLE 9Assume that we have proved $1 - x^2/6 \leq (\sin x)/x \leq 1$ for all x near but different from 0. What can we conclude about $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$?

$$1 - \frac{x^2}{6} \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^2}{6} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Problem Set 1.3

In Problems 1–12, use Theorem A to find each of the limits. Justify each step by appealing to a numbered statement, as in Examples 1–4.

1. $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 1)$

2. $\lim_{x \rightarrow -1} (3x^2 - 1)$

$$\lim_{x \rightarrow 1} 2x + \lim_{x \rightarrow 1} 1 = 2(1) + 1 = 3$$

5. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x + 1}{5 - 3x}$

6. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{4x^3 + 1}{7 - 2x^2}$

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 2} 2x + 1}{\lim_{x \rightarrow 2} 5 - 3x} = \frac{2(2) + 1}{5 - 3(2)} = \frac{5}{-1} = -5$$

9. $\lim_{t \rightarrow -2} (2t^3 + 15)^{13}$

10. $\lim_{w \rightarrow -2} \sqrt{-3w^3 + 7w^2}$

$$\begin{aligned} \left(\lim_{t \rightarrow -2} 2t^3 + 15 \right)^{13} &= \left[2(-2)^3 + 15 \right]^{13} = \left[-16 + 15 \right]^{13} \\ &= [-1]^{13} = -1 \end{aligned}$$

In Problems 13–24, find the indicated limit or state that it does not exist. In many cases, you will want to do some algebra before trying to evaluate the limit.

13. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4}$

14. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$

$\frac{0}{0}$ $\frac{1/2}{0}$

15. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1}$

16. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + x}{x^2 + 1}$

13) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^2 - 4}{2^2 + 4} = \frac{0}{8} = 0$

15) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1} = \frac{(-1)^2 - 2(-1) - 3}{-1 + 1} = \frac{0}{0}$

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-3)(\cancel{x+1})}{(\cancel{x+1})} = (-1-3) = -4$

-pva

19. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$

20. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 14x - 51}{x^2 - 4x - 21}$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1} = \frac{1^2 + 1 - 2}{1^2 - 1} = \frac{0}{0}$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+2)(\cancel{x-1})}{(x+1)(\cancel{x-1})} = \frac{3}{2}$

In Problems 25–30, find the limits if $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 3$ and $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -1$ (see Example 4).

25. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{f^2(x) + g^2(x)}$

26. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{2f(x) - 3g(x)}{f(x) + g(x)}$

27. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{g(x)} [f(x) + 3]$

28. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - 3]^4$

$$\sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} \cdot \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} 3 \right]$$

$$-1 \cdot [3 + 3] = -6$$

1.4

Limits Involving Trigonometric Functions

Sin	
Cos	sec
tan	csc

لنقوم بالتعويض
العبارة وازا
كانت الاجابة
صفر،
عبر النهاية

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sin \frac{\pi}{x}$$

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1$$

لنقوم بالتعويض
العبارة والنتيجة

$$\frac{0}{0}$$

يجب تحليل لداالة
صفر نتخلص منه بعض
القام كتم نفوض
واذا لم ينتج في النهاية
عبر موصو دة

حفظ

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t} = 0$$

النهاية الحكيمة الخاصة

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{t} = 3$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{3t} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{4t} = \frac{3}{4}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t}{t} = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan 5t}{t} = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\tan 4x} = \frac{5}{4}$$

EXAMPLE 1Find $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 \cos t}{t + 1}$.

$$= \frac{0^2 \cos(0)}{0 + 1} = \frac{0}{1} = 0$$

EXAMPLE 2

Find each limit.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$

(b) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{\sin t}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\tan x}$

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \frac{\sin 3x}{3x}$$

$$3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} = 3 \cdot 1 = 3$$

$$b) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{\sin t} =$$

نسبة البسط
والقامع
صفر

$$\frac{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t}}{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t}} = \frac{0}{1} = 0$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\tan x} =$$

نسبة البسط والقامع
صفر

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 4x}{x}}{\frac{\tan x}{x}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \left(\frac{\sin 4x}{4x} \right)'}{1 \left(\frac{\sin x}{x} \right)' \cdot \frac{1}{\cos x}} = \frac{4 \cdot 1}{1 \cdot 1} = 4$$

Problem Set 1.4

In Problems 1–14, evaluate each limit.

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x+1} = \frac{\cos 0}{0+1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$3. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos^2 t}{1 + \sin t} = \frac{\cos^2 0}{1 + \sin 0} = \frac{1}{1} = 1$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x}}{\frac{2x}{x}} = \frac{1}{2}$$

$$7. \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin 3\theta}{\tan \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 3\theta}{\theta}}{\frac{\tan \theta}{\theta}} = \frac{3 \cdot 1}{1} = 3$$

$$9. \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cot(\pi\theta) \sin \theta}{2 \sec \theta} \stackrel{(9)}{=} \frac{\frac{\cos \pi\theta}{\sin \pi\theta} \sin \theta}{\frac{2}{\cos \theta}}$$

$$11. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan^2 3t}{2t} = \frac{\cos \pi\theta \sin \theta \cos \theta}{2 \sin \pi\theta}$$

$$13. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t + 4t}{t \sec t} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \pi\theta}{2\pi} \cos \theta = \frac{1 \cdot 1}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}$$

$$(11) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3t}{2t \cos^2 3t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3t}{2t} \cdot \frac{1}{\cos^2 3t}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3t}{3t} \cdot \sin 3t \cdot \frac{1}{\cos^2 3t}$$

$$\frac{0}{1} = 0$$

$$(13) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t + 4t}{t \sec t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{t \sec t} + \frac{4t}{t \sec t}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3t}{3t} \cdot \cos t + 4 \cos t \right)$$

$$3 + 4 = 7$$

$$8. \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\tan 5\theta}{\sin 2\theta}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\frac{\tan 5\theta}{\theta}}{\frac{\sin 2\theta}{\theta}} = \frac{5}{2}$$

$$14. \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \theta}{\theta^2}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \cdot \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \cdot 1 = 1$$


1.5

Limits at Infinity; Infinite Limits

$$\lim_{x \rightarrow \infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$



$$x \rightarrow \infty \quad \frac{\text{سط}}{\text{مقام}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty}$$

$$\frac{\text{سط}}{\text{مقام}}$$

درجه سطر اكبر من مقام اذا النهاية $\infty =$
 درجه سطر اعظم درجه مقام اذا
 النهاية صفر
 اذا ساد درجه السطر
 درجه المقام تنو، لنهاية = $\frac{\text{مقام}}{\text{مقام}}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 + 2x}{x^3 + 1} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 1}{x^5 + 2x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^5 + 4}{3x^5 - 2} = \frac{2}{3}$$

EXAMPLE 1Show that if k is a positive integer, then

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^k} = 0 \quad \text{and} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^k} = 0$$

$$\frac{1}{\infty} = 0$$

$$\frac{1}{x} \quad \frac{1}{x^2} \quad \frac{1}{x^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^k} = \frac{1}{x^4} = \frac{1}{\infty^4} = 0$$

EXAMPLE 2Prove that $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^2} = 0$.

لجاء الينا عندها $x \rightarrow \infty$ نسق لهم اكدور
عنا اكدور

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{x^2}}{\frac{1}{x^2} + \frac{x^2}{x^2}} = \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2} + 1}$$

$$= \frac{\frac{1}{\infty} \rightarrow \text{zer}}{\frac{1}{\infty^2} + 1} = \frac{0}{0+1} = 0$$

EXAMPLE 3Find $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3}{1+x^3}$.


نسق الين
 x^3 ص

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2x^3}{x^3}}{\frac{1}{x^3} + \frac{x^3}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{\frac{1}{x^3} + 1}$$

$$= \frac{2}{\frac{1}{-\infty} + 1} = 2$$

EXAMPLE 5Find $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{(x-1)^2}$ and $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{(x-1)^2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{1}{0} = \text{النسبة غير موجودة}$$



$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{1}{0.001} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{(0.999-1)^2} = \frac{1}{0} = \infty$$

EXAMPLE 6Find $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x^2-5x+6}$.

$x \rightarrow 2$
 $= \frac{3}{4-10+6} = \frac{3}{0}$
 النسبة غير موجودة
 $-\infty$


$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{(x-3)(x-2)} = -\frac{2}{0} = \infty$$

Asymptote

خط التقارب

horizontal

خط تقارب افقي



مع خط افقي تقارب
منه الدالة تكون
لا تلمس

خط تقارب افقي عند $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

vertical

خط التقارب العمودي

$x=1$



خط التقارب العمودي يقع عند اصفاء الحسام (C)
ويعتق القائمة التالية


$$\lim_{x \rightarrow C^+} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow C^-} f(x) = -\infty$$

EXAMPLE 7

Find the vertical and horizontal asymptotes of the graph of $y = f(x)$ if

$$f(x) = \frac{2x}{x-1}$$



$$x=1$$

$$x-1=0$$


العمودي

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x}{x-1} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x}{x-1} = -\infty$$

خط المقارب العمودي


$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x}{x}}{\frac{x}{x} - \frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{1 + \frac{1}{x}}\end{aligned}$$




$$\begin{aligned}&\frac{2}{1 + \frac{1}{\infty}} \text{ zero} \\ &= 2\end{aligned}$$

1.6


Continuity of Functions



النهاية غير موجودة
غير متصل



النهاية موجودة
 $f(c) \neq \lim_{x \rightarrow c} f(x)$
غير متصل



له نهاية متصل

خاصية شروط الاتصال عند النقطة

① $f(c)$ موجودة

الدالة معرفة عند c

$f(c) = -$

② النهاية موجودة

$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -$

③ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

إذا تحقق الشرط
 $f(x)$ is continuous at $x=c$

EXAMPLE 1 Let $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$, $x \neq 2$. How should f be defined at $x = 2$ in order to make it continuous there?

نقطة تعريف 2 في الدالة

لن يجب ان تكونه منتهية $f(2)$ حتى تصبح

الدالة متصلة عند 2

① $f(2) = 4$?? $= f(2)$

② $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2} = 4$

③

$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

$4 = 4$

② removable discontinuity

يجب ان يكونه
نكونه له دالة متصلة
 $4 = f(2)$

$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & x \neq 2 \\ 4 & x = 2 \end{cases}$

① جميع كثيرات الحدود متصلة على جميع الأعداد

$f(x) = x^2 + 2x + 5$

② دوال الجذور الذائبة متصلة فقط على $x \geq 0$

③ دوال القيمة المطلقة $|x|$ متصلة على جميع الأعداد

④ الدوال الكسرية غير متصلة عند أصفاء المقام $\frac{1}{x-1}$

⑤ دالة مجموع أو ضرب دالتين $f+g$ $f \cdot g$ $\frac{f}{g}$

EXAMPLE 2

At what numbers is $F(x) = (3|x| - x^2)/(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})$ continuous?

$$F(x) = \frac{3|x| - x^2}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$$



$|x|$ and x^2 $\sqrt[3]{x} \Rightarrow$ متناهي كد، لا عدد

$\sqrt{x} \Rightarrow$ متناهي كد، لا عدد موجب

The function $F(x)$ continuous at All Positive numbers

EXAMPLE 3

Determine all points of discontinuity of $f(x) = \frac{\sin x}{x(1-x)}$, $x \neq 0, 1$. Classify each point of discontinuity as removable or nonremovable.

نبحث نواحيضاد المقام للمحول كد نقاط الانقطاع

$$x(1-x) = 0$$

$$x = 0$$

$$1-x = 0$$

$$x = 1$$

الدالة متناهي عند جميع الأعداد حاصدا $x=0$ $x=1$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin x}{x(1-x)} = \frac{\text{معي}}{\text{صفر}} = \text{the limit is not exist}$
non removable discontinuity

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x(1-x)} = \frac{0}{0}$ متناهي، لتقليل

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1-x} = 1$ المتناهي من الدرجة 0
removable continuous

$$h(x) = f(g(x)) = f \circ g(x)$$

إذا كانت g متصلة و f متصلة إذا التركيب مكونة متصلة

EXAMPLE 4 Show that $h(x) = |x^2 - 3x + 6|$ is continuous at each real number.

$$g(x) = x^2 - 3x + 6 \quad \text{متصلة في جميع الأعداد}$$

$$f(x) = |x| \quad \text{متصلة في جميع الأعداد}$$

$$h(x) = f(g(x)) \quad \text{متصلة في جميع الأعداد}$$

EXAMPLE 5 Show that h is continuous except at $3, -2$

$$h(x) = \sin \frac{x^4 - 3x + 1}{x^2 - x - 6}$$

$$g(x) = \frac{x^4 - 3x + 1}{x^2 - x - 6}$$

$$f(x) = \sin x$$

متصلة

$$h(x) = f \circ g(x)$$



$\sin x$ متصلة إذا كانت في المجال $g(x)$

$g(x)$ دالة كسرية إذا كانت غير صفية، صفية

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x - 3)(x + 2) = 0$$

$$x - 3 = 0 \quad x = 3$$

$$x + 2 = 0 \quad x = -2$$

دالة g متصلة عند جميع الأرقام عدا $3, -2$



$$\lim_{x \rightarrow a^+} \qquad \lim_{x \rightarrow b^-}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-(-2)^2} \approx 0$$

≈ -1.9
 u

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-u} = 0$$

النقطة موجودة و النهاية موجودة على نفس

الطرفان صحيح $(-2, 2)$

Problem Set 1.6

In Problems 1–15, state whether the indicated function is continuous at 3. If it is not continuous, tell why.

1. $f(x) = (x - 3)(x - 4)$ 2. $g(x) = x^2 - 9$

① $f(3) = (3-3)(3-4) = 0$

② $\lim_{x \rightarrow 3} (x-3)(x-4) = 0$

③ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ Continuous

9. $h(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

① $f(3) = \frac{3^2 - 9}{3 - 0} = \frac{0}{0}$

$f(x)$ is not continuous at $x=3$
because $f(x)$ is not exist

$$11. r(t) = \begin{cases} \frac{t^3 - 27}{t - 3} & \text{if } t \neq 3 \\ 27 & \text{if } t = 3 \end{cases}$$

$$(A^3 - B^3)$$

$$= (A - B)(A^2 + AB + B^2)$$

$$① f(3) = 27$$

$$② \lim_{t \rightarrow 3} \frac{t^3 - 3^3}{t - 3} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{t \rightarrow 3} \frac{(t - 3)(t^2 + 3t + 9)}{t - 3} = 9 + 9 + 9 = 27$$

$$③ f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \quad \text{continuous}$$

$$27 = 27$$

$$13. f(t) = \begin{cases} t - 3 & \text{if } t \leq 3 \\ 3 - t & \text{if } t > 3 \end{cases}$$

$$① f(3) = 0 \quad \checkmark$$

$$② \lim_{t \rightarrow 3^+} 3 - t = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 3^-} t - 3 = 0$$

continuous


$$③ \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$$

$$0 = 0$$

In Problems 24–35, at what points, if any, are the functions discontinuous?

27. $r(\theta) = \tan \theta$

$$\frac{\pi}{2} + 2n\pi$$



31. $G(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$

الجذر مداخل الجذر الحيز من صفر

$$4 - x^2 > 0 \quad 4 > x^2 \quad \pm 2 > |x|$$

$$\sqrt{4-x^2} = 0 \quad 4-x^2 = 0 \quad \sqrt{4} = \sqrt{x^2}$$

$$\pm 2 > |x| \quad x = \pm 2$$

مرف حفظ في صفر، لغير



$$(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$$