

0.2

متباينة =

Inequalities and Absolute Values

Equation

$$2x + 1 = 5$$

$$2x = 4$$

$$x = 2$$

Inequalities

$$2x + 1 < 5$$

الحداثة كد تكد
Interval

$$2x + 1 < 5$$

$$2x < 4$$

$$x < 2$$

الحدا هو جميع الارقام اقل من 2

Interval Notation

$$\{x : 5 \leq x\}$$

x حيث ان x اكبر
او تساوي 5

$$\{x : 1 < x < 5\}$$



$$(1, 5)$$

$$\{x : 1 \leq x \leq 5\}$$



$$[1, 5]$$

$$\{x : 1 \leq x < 5\}$$



$$[1, 5)$$

$$x < 1$$



$$(-\infty, 1)$$

$$x \geq 5$$



$$[5, \infty)$$

هذا المتباينة

* هذا المتباينة هو نفس صيغة المتباينة العادية الا في حالة العزب او المتباينة عدد صلب قلب المتباينة

$$-2x + 1 \geq 10$$

$$\frac{-2x}{-2} \geq \frac{9}{-2}$$

$$x \leq -4.5$$

$$0 \leq x+3 \leq 6$$

$$-3 \leq x \leq 3$$



EXAMPLE 1


Solve the inequality $2x - 7 < 4x - 2$ and show the graph of its solution set.

$$2x - 7 < 4x - 2$$

$$2x - 4x < -2 + 7$$

$$\frac{-2x}{-2} < \frac{5}{-2}$$

$$x > -2.5$$



EXAMPLE 2

Solve $-5 \leq 2x + 6 < 4$.

$$-5 \leq 2x + 6 < 4$$

$$-5 - 6 \leq 2x < 4 - 6$$

$$\frac{-11}{2} \leq \frac{2x}{2} < \frac{-2}{2}$$

$$-5.5 \leq x < -1$$

بالنصف 2

$$[-5.5, -1)$$



EXAMPLE 3Solve the quadratic inequality $x^2 - x < 6$.

① تحليل للمعادلة التربيعية

$$x^2 - x - 6 < 0$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$


$$(x - 3)(x + 2) = 0$$

$\downarrow \quad \downarrow$
 $x=3 \quad x=-2$

$$(x - 3)(x + 2) < 0$$

② صاعد غزب الحدين
يجب ان يكون سالب

③ نرسم الحدين
كـ صفا الاعداد
واقبت / الاجابة
test point



الحل هو الفترة سالب $(-2, 3)$

EXAMPLE 4Solve $3x^2 - x - 2 > 0$.


$$(3x + 2)(x - 1) > 0$$

صاعد غزب الحدين
يجب ان يكون موجب

$$3x + 2 = 0$$

$$3x = -2$$

$$x = -\frac{2}{3}$$




الحل $(-\infty, -\frac{2}{3}) \cup (1, \infty)$

EXAMPLE 5

Solve $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$.

فترة الحل يجب أن تكون صواب



فترات الحل

$$(-\infty, -2) \cup [1, \infty)$$

يجب استثناء الحالة التي يكون فيها المقام 0

$$x+2=0$$

$$x = -2$$

حذف $x = -2$ من الحل

Absolute Value

القيمة المطلقة

$$|5| = 5$$

$$|-5| = 5$$

خصائص القيمة المطلقة

$$* |ab| = |a||b| \Rightarrow |3x| = |3||x| = 3|x|$$

$$* \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \Rightarrow \left| \frac{-4}{b} \right| = \frac{|-4|}{|b|} = \frac{4}{|b|}$$

$$* |a+b| \leq |a| + |b| \quad |-3+5| ? | -3| + |5|$$
$$2 \leq 3 + 5$$

$$* |a-b| \geq ||a| - |b|| \quad |5-3| ? 5 - 3$$
$$2 \geq 2$$

ملاحظة

$$|x| < a \iff -a < x < a$$

$$|x| < 5 \iff -5 < x < 5$$



$$|x| > a \iff x < -a \quad x > a$$



EXAMPLE 8 Solve the inequality $|x - 4| < 2$ and show the solution set on the real line. Interpret the absolute value as a distance.

$$|x - 4| < 2 \iff -2 < x - 4 < 2$$

$$-2 + 4 < x < 2 + 4$$

$$2 < x < 6 \quad (2, 6)$$



EXAMPLE 9 Solve the inequality $|3x - 5| \geq 1$ and show its solution set on the real line.

$$|3x - 5| \geq 1$$

$$3x - 5 \leq -1 \quad \text{or} \quad 3x - 5 \geq 1$$

$$3x \leq -1 + 5$$


$$3x \geq 6$$

$$3x \leq 4$$

$$x \geq \frac{6}{3}$$

$$x \leq \frac{4}{3}$$

$$\text{or} \quad x \geq 2$$



$$(-\infty, \frac{4}{3}] \cup [2, \infty)$$

EXAMPLE 13Solve $x^2 - 2x - 4 \leq 0$.نبحث عن الفترة التي تكون فيها $x^2 - 2x - 4 \leq 0$

$$x^2 - 2x - 4 = 0 \quad a = 1 \quad b = -2 \quad c = -4$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-2) \pm \sqrt{4 - (4 \times 1 \times -4)}}{2}$$


$$\sqrt{5} = 2.1$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{20}}{2} = \frac{2}{2} \pm \frac{\sqrt{4 \times 5}}{2}$$

$$1 + \sqrt{5} \approx 3.1$$

$$x = 1 \pm \sqrt{5}$$

$$1 - \sqrt{5} \approx -1.1$$



$$[1 - \sqrt{5}, 1 + \sqrt{5}]$$

Problem Set 0.2

1. Show each of the following intervals on the real line.

(a) $[-1, 1]$



(b) $(-4, 1]$



(c) $(-4, 1)$



(d) $[1, 4]$



(e) $[-1, \infty)$



(f) $(-\infty, 0]$



In each of Problems 3–26, express the solution set of the given inequality in interval notation and sketch its graph.


3. $x - 7 < 2x - 5$

4. $3x - 5 < 4x - 6$

$$-7 + 5 < 2x - x$$

$$-2 < x$$

$$x > -2$$



11. $x^2 + 2x - 12 < 0$

12. $x^2 - 5x - 6 > 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \times 1 \times (-12)}}{2 \times 1} = \frac{-2 \pm \sqrt{52}}{2}$$

$$x = -1 \pm \frac{\sqrt{52}}{2} = -1 \pm \frac{\sqrt{13} \sqrt{4}}{2} = -1 \pm \sqrt{13}$$



$$(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$$

13. $2x^2 + 5x - 3 > 0$

14. $4x^2 - 5x - 6 < 0$

15. $\frac{x+4}{x-3} \leq 0$

16. $\frac{3x-2}{x-1} \geq 0$

17. $\frac{2}{x} < 5$

18. $\frac{7}{4x} \leq 7$

13) $2x^2 + 5x - 3 > 0$

$$(2x - 1)(x + 3) > 0$$


$$2x - 1 = 0$$

$$2x = 1$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$x + 3 = 0$$

$$x = -3$$



$$(-\infty, -3) \cup (\frac{1}{2}, \infty)$$

(7) $\frac{2}{x} < 5$


لغزب بـ x

$$2 < 5x$$

$$5x > 2$$

$$x > \frac{2}{5}$$

$$x - \frac{2}{5} > 0$$



$$(\frac{2}{5}, \infty)$$

21. $(x + 2)(x - 1)(x - 3) > 0$

22. $(2x + 3)(3x - 1)(x - 2) < 0$

23. $(2x - 3)(x - 1)^2(x - 3) \geq 0$

24. $(2x - 3)(x - 1)^2(x - 3) > 0$

25. $x^3 - 5x^2 - 6x < 0$


26. $x^3 - x^2 - x + 1 > 0$

21) $(x + 2)(x - 1)(x - 3) > 0$

$x + 2 = 0$
 $x = -2$

$x - 1 = 0$
 $x = 1$

$x - 3 = 0$
 $x = 3$



$(-2, 1) \cup (3, \infty)$

25) $x^3 - 5x^2 - 6x < 0$


$x(x^2 - 5x - 6) < 0$

$x(x + 1)(x - 6) < 0$

$x = 0$

$x = -1$

$x = 6$



$(-\infty, -1) \cup (0, 6)$

In Problems 35–44, find the solution sets of the given inequalities.

35. $|x - 2| \geq 5$

36. $|x + 2| < 1$

37. $|4x + 5| \leq 10$

38. $|2x - 1| > 2$

39. $\left| \frac{2x}{7} - 5 \right| \geq 7$

40. $\left| \frac{x}{4} + 1 \right| < 1$

$$\frac{2x}{7} - 5 \leq -7$$

$$\frac{2x}{7} - 5 \geq 7$$

$$\frac{2x}{7} \leq -2$$

$$\frac{2x}{7} \geq 12$$

$$x \leq -\frac{2 \times 7}{2}$$

$$x \geq 42$$


$$x \leq -7$$



$$(-\infty, -7] \cup [42, \infty)$$


0.3

The Rectangular Coordinate System



(Distance)

المسافة بين نقطتين



$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

أمثلة

EXAMPLE 1 Find the distance between

(a) $P(-2, 3)$ and $Q(4, -1)$
 $x_1 \ y_1 \quad x_2 \ y_2$


(b) $P(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ and $Q(\pi, \pi)$
 $x_1 \ y_1 \quad x_2 \ y_2$

$$a) \quad d = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (-1 - 3)^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52}$$

$$b) \quad d = \sqrt{(\pi - \sqrt{2})^2 + (\pi - \sqrt{3})^2} = 2.23$$

The equation of circle

معادله الدائرة



$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$


$$(x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 16$$

$$h = 2$$

$$k = -2$$

$$r = \sqrt{16} = 4$$

المعادلة



EXAMPLE 2 Find the standard equation of a circle of radius 5 and center (1, -5). Also find the y-coordinates of the two points on this circle with x-coordinate 2.

اكتب معادله الدائرة

$$(1, -5)$$

$$r=5$$

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

$$(x-1)^2 + (y+5)^2 = 25$$

نفوض فيه $x=2$ ونجيب عليه y

$$(2-1)^2 + (y+5)^2 = 25$$


$$1 + (y+5)^2 = 25$$

$$\sqrt{(y+5)^2} = \sqrt{24}$$

$$y+5 = \pm \sqrt{24}$$

$$y = \pm \sqrt{24} - 5$$

$$y = \pm 2\sqrt{6} - 5$$



EXAMPLE 3 Show that the equation

$$x^2 - 2x + y^2 + 6y = -6$$



represents a circle, and find its center and radius.

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

$$\underbrace{x^2 - 2x + 1}_{\left(\frac{b}{2}\right)^2} + \underbrace{y^2 + 6y + 9}_{\left(\frac{b}{2}\right)^2} = -6 + 1 + 9$$

$$(x-1)^2 + (y+3)^2 = 4$$

$$h=1 \quad k=-3 \quad r=2$$



معادله خط
Equation of the line

$$y = mx + b$$

slope
y intercept
مقطع y

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{\text{فرق } y}{\text{فرق } x} = \text{اعلى slope}$$



$$y = 2x + 1$$

معادله الخط المستقيم

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

نقطة

$$x_1, y_1 \\ (3, 2)$$

$$x_2, y_2 \\ (8, 4)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 - 2}{8 - 3} = \frac{2}{5} = 2.5$$

$$y - y_1 = 2.5(x - x_1)$$

$$y - 2 = 2.5(x - 3)$$

EXAMPLE 5

Find an equation of the line through $(-4, 2)$ and $(6, -1)$.

اعتب معادله الخط

$$x_1, y_1 \\ (-4, 2)$$

$$x_2, y_2 \\ (6, -1)$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-1 - 2}{6 - (-4)} = \frac{-3}{10}$$

$$y - 2 = -\frac{3}{10}(x + 4)$$

✓ دائماً احسب m هو العدد الحرفي x $y =$ عند الحذف $y =$ عند الحذف

$$y = 3x + 5$$

$$m = 3$$


$$\frac{2y}{2} = \frac{10x}{2} - \frac{2}{2}$$

$$y = 5x - 1 \quad m = 5$$

ای خطین متوازی (Parallel) کیون

لہا نفہ فیہ اعلیٰ $m_1 = m_2$

ای خطین متعامدین (Perpendicular) کیون



$$\frac{1}{\text{مید اول}} = - \frac{1}{\text{مید دوتی}}$$

$$m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

EXAMPLE 6 Find the equation of the line through $(6, 8)$ that is parallel to the line with equation $3x - 5y = 11$.

حساب مید خط (m_1)

$$3x - 5y = 11$$

$$y = \frac{3x}{-5} + \frac{11}{-5}$$


$$m_1 = \frac{3}{5}$$

مید $m_2 = \frac{3}{5}$ میر بانفہ $(6, 8)$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 8 = \frac{3}{5}(x - 6)$$

EXAMPLE 7 Find the equation of the line through the point of intersection of the lines with equations $3x + 4y = 8$ and $6x - 10y = 7$ that is perpendicular to the first of these two lines (Figure 16).



$$y - y_1 = m_2(x - x_1)$$

$$-\frac{1}{m_1} = m_2 \text{ لكي تكونا } \perp$$

$$3x + 4y = 8$$

$$y = -\frac{3}{4}x + 2$$

$$m_1 = -\frac{3}{4}$$

$$m_2 = \frac{4}{3}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - \frac{1}{2} = \frac{4}{3}(x - 2)$$

نريد معادله الخطين كتاب نقطة التقاط

$$\begin{array}{r} (3x + 4y = 8) \quad \times -2 \\ 6x - 10y = 7 \\ \hline -6x - 8y = -16 \end{array}$$

$$-18y = -9$$

$$y = \frac{-9}{-18} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$3x + 4\left(\frac{1}{2}\right) = 8$$

$$3x = 6$$


$$\boxed{x = 2}$$

Problem Set 0.3

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

In Problems 11–16, find the equation of the circle satisfying the given conditions.

11. Center $(\overset{h}{1}, \overset{k}{1})$, radius $\overset{r}{1}$ $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$
12. Center $(-2, 3)$, radius 4
13. Center $(\overset{h}{2}, \overset{k}{-1})$, goes through $(5, 3)$



$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(5-2)^2 + (3-(-1))^2}$$

$$r = d = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 25$$

In Problems 17–22, find the center and radius of the circle with the given equation.

17. $x^2 + 2x + 10 + y^2 - 6y - 10 = 0$

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2$$

$$\underbrace{x^2 + 2x + 1}_{\left(\frac{b}{2}\right)^2} + \underbrace{y^2 - 6y + 9}_{\left(\frac{b}{2}\right)^2} = 10 - 10 + 1 + 9$$

$$(x+1)^2 + (y-3)^2 = 10$$

$$\text{Centre } (-1, 3) \quad r = \sqrt{10}$$

In Problems 23–28, find the slope of the line containing the given two points.

23. (1, 1) and (2, 2)

24. (3, 5) and (4, 7)

25. (2, 3) and (−5, −6)

26. (2, −4) and (0, −6)

27. (3, 0) and (0, 5)

28. (−6, 0) and (0, 6)

32) $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2-1}{2-1} = 1$

25) $m = \frac{-6-3}{-5-2} = \frac{9}{7}$

In Problems 29–34, find an equation for each line. Then write your answer in the form $Ax + By + C = 0$.

29. Through (2, 2) with slope −1

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 2 = -1(x - 2)$$

$$y - 2 = -x + 2 \quad \checkmark$$

$$y = -x + 4 \quad \checkmark \quad y + x - 4 = 0 \quad \checkmark$$

33. Through (2, 3) and (4, 8)

34. Through (4, 1) and (8, 2)

In Problems 35–38, find the slope and y-intercept of each line.

35. $3y = -2x + 1$

36. $-4y = 5x - 6$

33) $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{8-3}{4-2} = \frac{5}{2}$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$
$$y - 3 = \frac{5}{2}(x - 2)$$

$$2y - 6 = 6x - 10$$

$$2y - 6x + 4 = 0$$

In Problems 35–38, find the slope and y-intercept of each line. $y = mx + \textcircled{b}$
 35. $3y = -2x + 1$ 36. $-4y = 5x - 6$

35) $3y = -2x + 1$

$$y = -\frac{2}{3}x + \textcircled{\frac{1}{3}}$$

$$y \text{ intercept} = \frac{1}{3}$$

ملاحظة

يمكن صياغة b بتعويض $x=0$

39. Write an equation for the line through $(3, -3)$ that is
- (a) parallel to the line $y = 2x + 5$;
 - (b) perpendicular to the line $y = \textcircled{2}x + 5$;
 - (c) parallel to the line $2x + 3y = 6$;
 - (d) perpendicular to the line $2x + 3y = 6$;

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y + 3 = m_1(x - 3)$$

a) $m_2 = m_1 = 2$

$$y + 3 = 2(x - 3)$$

b) $m_1 = -\frac{1}{m_2} = -\frac{1}{2}$

$$y + 3 = -\frac{1}{2}(x - 3)$$

$$c) \quad 2x + 3y = 6$$

$$y = \frac{6}{3} - \frac{2x}{3}$$

$$m = -\frac{2}{3}$$

$$y + 3 = -\frac{2}{3} (x - 3)$$

$$d) \quad y = \frac{6}{3} - \frac{2}{3}x$$


$$m_2 = -\frac{2}{3}$$

$$m_1 = \frac{3}{2}$$

$$y + 3 = \frac{3}{2} (x - 3)$$

0.5

Functions and Their Graphs



$$y = f(x)$$


$$y = 3x + 10$$

↓ جابذة
↓ عكس التضا

$$x = 1 \quad y = 3 + 10 = 13$$

$$x = 2 \quad y = 6 + 10 = 16$$

$$x = 10 \quad y = 30 + 10 = 40$$



EXAMPLE 1 For $f(x) = x^2 - 2x$, find and simplify

(a) $f(4)$

(b) $f(4 + h)$

(c) $f(4 + h) - f(4)$

(d) $[f(4 + h) - f(4)]/h$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

a) $f(4) = 4^2 - 2(4) = 16 - 8 = 8$

b) $f(4+h) = (4+h)^2 - 2(4+h)$
 $= 16 + 8h + h^2 - 8 - 2h$
 $= h^2 + 6h + 8$

c) $f(4+h) - f(4) = h^2 + 6h + 8 - 8 = h^2 + 6h$

d) $\frac{f(4+h) - f(4)}{h} = \frac{h^2 + 6h}{h} = \frac{h(h+6)}{h} = h+6$

كيفية كتابة المجال لعدد من الدوال

① إذا كانت الدالة كثيرة حدود

مثلاً $f(x) = x^5 + 4x^3 - 2x + 1$
المجال واحد هو $(-\infty, \infty)$ $\mathbb{R}$ كل الأعداد

② الدالة الأسية تكون المجال هو كل الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر المقام

$$f(x) = \frac{3}{x+5} \quad x+5 \neq 0 \quad x \neq -5$$

المجال هو كل الأعداد ما عدا -5 $\mathbb{R} - \{-5\}$

③ في حالة الدالة الجذرية يجب أن يكون ما داخل الجذر موجب
أكبر من صفر

$$f(x) = \sqrt{x-2} \quad x-2 \geq 0 \quad x \geq 2 \quad [2, \infty)$$

④ دالة جذرية عكسية يجب أن يكون ما داخل الجذر أكبر من صفر ولا يساوي صفر

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}} \quad x-2 > 0 \quad x > 2 \quad (2, \infty)$$

EXAMPLE 2

Find the natural domains for

(a) $f(x) = 1/(x - 3)$

(b) $g(t) = \sqrt{9 - t^2}$

(c) $h(w) = 1/\sqrt{9 - w^2}$

a) $f(x) = \frac{1}{x-3} \quad x-3=0 \quad x=3$

جميع الأعداد ما عدا $x=3$
 $\{x : x \neq 3\}$

b) $g(t) = \sqrt{9 - t^2} \quad 9 - t^2 \geq 0$

$9 \geq t^2 \quad 3 \geq |t|$

$|t| \leq 3 \quad \leadsto \quad -3 \leq t \leq 3$
 $[-3, 3]$

c) $h(w) = \frac{1}{\sqrt{9 - w^2}}$

$9 - w^2 > 0 \quad 9 > w^2$


$3 > |w| \quad |w| < 3$

$-3 < w < 3 \quad (-3, 3)$

Graphs of the functions

$$y = mx + b$$

الدالة الخطية



$$m = \text{سلبي}$$




$$m = \text{موجب}$$


∩ ∪

الدالة التربيعية


$$y = x^2$$



$$y = x^2 + 2$$




$$y = x^2 - 1$$



$$y = (x + 2)^2$$



$$y = (x - 2)^2 - 1$$




$$y = \frac{1}{x}$$




دالة كسرية

$$y = \frac{1}{x} + 2$$




$$y = \frac{1}{x + 2}$$






EXAMPLE 4

Sketch the graphs of

(a) $f(x) = x^2 - 2$



الدالة الزوجية والفردي even odd function



الدالة الزوجية $\iff$ اذا عوضنا x و $-x$ في المعادلة
تكون النتيجة نفسها $f(x) = f(-x)$

الدالة الفردي $\iff$ اذا عوضنا x و $-x$ يكون النتيجة
عكس ما كان $f(x) = -f(-x)$

خبر دو ان كنته كدور
اذا كانت كدالة من زوجية او اعداد ثابتة $\iff$ even
اذا كانت كدالة من فردي

$$f(x) = x^4 + 2x^2 + 5$$

كدالة من زوجية
even

$$f(x) = x^5 + x^3 + x$$

كدالة من فردي
odd

EXAMPLE 5

Is $f(x) = \frac{x^3 + 3x}{x^4 - 3x^2 + 4}$ even, odd, or neither?
زوجية فردية زوجية و فردية

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x}{x^4 - 3x^2 + 4}$$

$$f(-x) = \frac{(-x)^3 + 3(-x)}{(-x)^4 + 3(-x)^2 + 4} = \frac{-x^3 - 3x}{x^4 + 3x^2 + 4}$$

$$= - \left[\frac{x^3 + 3x}{x^4 + 3x^2 + 4} \right]$$

$$f(-x) = -f(x) \quad \text{odd function}$$

الفردية

Problem Set 0.5

9. For $f(x) = 2x^2 - 1$, find and simplify $[f(a+h) - f(a)]/h$.

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f(a+h) = 2(a+h)^2 - 1 = 2(a^2 + 2ah + h^2) - 1 \\ = 2a^2 + 4ah + h^2 - 1$$

$$f(a) = 2a^2 - 1$$

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\cancel{2a^2} + 4ah + \cancel{h^2} - \cancel{1} - \cancel{2a^2} + \cancel{1}}{h}$$

$$= \frac{4ah + h^2}{h} = \cancel{h}(4a + \cancel{h}) = 4a + h$$

13. Find the natural domain for each of the following.

(a) $F(z) = \sqrt{2z+3}$

(b) $g(v) = 1/(4v-1)$

(c) $\psi(x) = \sqrt{x^2-9}$

(d) $H(y) = -\sqrt{625-y^4}$

a) $f(z) = \sqrt{2z+3}$

$$2z+3 \geq 0$$

$$z \geq -\frac{3}{2}$$

$$\left[-\frac{3}{2}, \infty\right)$$



b) $g(v) = \frac{1}{4v-1}$

$$4v-1=0$$

$$v = \frac{1}{4}$$

$$\{v : v \neq \frac{1}{4}\}$$

$$v \neq \frac{1}{4} : v \in \mathbb{R}$$

c) $\psi(x) = \sqrt{x^2-9}$

$$x^2-9 \geq 0$$

$$x^2 \geq 9$$

$$|x| \geq 3$$



$$(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$$

d) $H(y) = \sqrt{625 - y^4}$

$$625 - y^4 \geq 0$$

$$625 \geq y^4$$

$$\sqrt[4]{y^4} \leq \sqrt[4]{625}$$

$$|y| \leq 5$$

$$[-5, 5]$$

$$\{y \in \mathbb{R} : -5 \leq y \leq 5\}$$

In Problems 15–30, specify whether the given function is even, odd, or neither, and then sketch its graph.

15. $f(x) = -4$

16. $f(x) = 3x$

17. $F(x) = 2x + 1$

18. $F(x) = 3x - \sqrt{2}$


19. $g(x) = 3x^2 + 2x - 1$

20. $g(u) = \frac{u^3}{8}$

21. $g(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

22. $\phi(z) = \frac{2z + 1}{z - 1}$

15) $f(x) = -4$ even




17) $f(x) = 2x + 1$

$f(-x) = -2x + 1$

Neither even nor odd
 ✓ is odd, is odd

$y = mx + b$




$$21) \quad g(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$$

$$g(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 - 1} = -\frac{x}{x^2 - 1}$$

$$f(x) = -f(-x)$$

odd

x	0	1	-1	2	-2	3	-3
g(x)	0	∞	∞	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{3}{8}$	$-\frac{3}{8}$



0.6

Operations on Functions


Sums, Differences, Products, Quotients, and Powers
 Consider functions f and g with formulas

$$f(x) = \frac{x-3}{2}, \quad g(x) = \sqrt{x}$$

Consider functions

العمليات للدالة الجبرية تكون
 تعاطف، كالمثلث في حالة
 الجمع والفرق، والضرب

$$(f+g)(x) = \frac{x-3}{2} + \sqrt{x} \quad [0, \infty)$$



Formula	Domain
$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \frac{x-3}{2} + \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = \frac{x-3}{2} - \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \frac{x-3}{2} \cdot \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x-3}{2\sqrt{x}}$	$(0, \infty)$

في حالة الضرب

$$\frac{f}{g}(x) = \frac{\frac{x-3}{2}}{\sqrt{x}} = \frac{x-3}{2\sqrt{x}} \quad [0, \infty)$$

حيث الدالة في
 حالة الضرب هو نفس

العمليات في حالة الجمع لكن
 نستثنى منه الصفر، الحاصل

$$\sqrt{x}^2 = 0^2$$

$$x = 0$$


الاصابة (0, ∞) لا عد ١

$$(0, \infty)$$

EXAMPLE 1 Let $F(x) = \sqrt[4]{x+1}$ and $G(x) = \sqrt{9-x^2}$, with respective natural domains $[-1, \infty)$ and $[-3, 3]$. Find formulas for $F+G$, $F-G$, $F \cdot G$, F/G , and F^5 and give their natural domains.

$$(F+G)(x) = \sqrt[4]{x+1} + \sqrt{9-x^2}$$

$$\text{domain } [-1, 3]$$



$$(F-G)(x) = \sqrt[4]{x+1} - \sqrt{9-x^2} \quad [-1, 3]$$

$$(F \cdot G)(x) = \sqrt[4]{x+1} \sqrt{9-x^2} \quad [-1, 3]$$

$$\frac{F}{G}(x) = \frac{\sqrt[4]{x+1}}{\sqrt{9-x^2}} \quad [-1, 3)$$

$$\sqrt{9-x^2} = 0$$

$$9-x^2 = 0$$

$$9 = x^2$$

$$\sqrt{9} = x$$

$$\pm 3 = x$$

نجدت عن اصفاء الكفام

$$F^5(x) = \left(\sqrt[4]{x+1}\right)^5 = (x+1)^{5/4}$$

$$\text{domain } [-1, \infty)$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{x-3}{2}\right) = \sqrt{\frac{x-3}{2}}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = \frac{\sqrt{x}-3}{2}$$

Composition of function

$$g \circ f(x) = g(f(x)) \quad \text{يعوض } f \text{ داخل } g$$

$$f \circ g(x) = f(g(x)) \quad \text{يعوض } g \text{ داخل } f$$

$$f(x) = \frac{x-3}{2}$$

$$g(x) = \sqrt{x}$$

$$g \circ f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{2}}$$

$$f \circ g(x) = \frac{\sqrt{x}-3}{2}$$

EXAMPLE 2 Let $f(x) = 6x/(x^2 - 9)$ and $g(x) = \sqrt{3x}$, with their natural domains. First, find $(f \circ g)(12)$; then find $(f \circ g)(x)$ and give its domain.

SOLUTION

$$(f \circ g)(12) = f(g(12)) = f(\sqrt{36}) = f(6) = \frac{6 \cdot 6}{6^2 - 9} = \frac{4}{3}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{3x}) = \frac{6\sqrt{3x}}{(\sqrt{3x})^2 - 9}$$

$$f(x) = \frac{6x}{x^2 - 9}$$

$$g(x) = \sqrt{3x}$$

$$\neq \quad g(12) = \sqrt{3(12)} = \sqrt{36} = 6 \quad f(6) = \frac{6 \cdot 6}{6^2 - 9} = \frac{36}{27} = \frac{4}{3}$$


$$* f \circ g(x) = \frac{6\sqrt{3x}}{(\sqrt{3x})^2 - 9} = \frac{6\sqrt{3x}}{3x - 9}$$

حساب مجال الدالة المركبة
لبعد التركيب يتم تعويضها في مجال الدالة الاولي

$$\frac{6\sqrt{3x}}{3x - 9}$$

$$3x \geq 0$$

$$x \geq 0$$



$$3x - 9 = 0$$

$$x = 3$$

$$[0, 3) \cup (3, \infty)$$

المجال

EXAMPLE 3

Write the function $p(x) = (x + 2)^5$ as a composite function $g \circ f$.

$$p(x) = (x + 2)^5$$

$$g(x) = (x + 2)$$

$$f(x) = x^5$$

$$f \circ g(x) = (x + 2)^5$$




Figure 7




Figure 8



EXAMPLE 4 Sketch the graph of $g(x) = \sqrt{x+3} + 1$ by first graphing $f(x) = \sqrt{x}$ and then making appropriate translations.

دالة الجذر


$$f(x) = \sqrt{x}$$

x	f(x)
0	0
4	2
9	3
16	4


دالة الجذر x صوفه فقط
كل الاعداد الموجبه $[0, \infty)$



$$\sqrt{x}$$



$$\sqrt{x+1}$$




$$\sqrt{x-3}$$



$$\sqrt{x-1}$$



$$\sqrt{x+2}$$



$$\sqrt{x+2} - 4$$

Problem Set 0.6

1. For $f(x) = x + 3$ and $g(x) = x^2$, find each value (if possible).

(a) $(f + g)(2)$

(b) $(f \cdot g)(0)$

(c) $(g/f)(3)$

(d) $(f \circ g)(1)$

(e) $(g \circ f)(1)$

(f) $(g \circ f)(-8)$

$$\begin{aligned} \text{a) } (f+g)(2) &= f(2) + g(2) \\ &= 5 + 4 = 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } (f \cdot g)(0) &= f(0) \cdot g(0) \\ &= 3 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$


$$\text{c) } \left(\frac{g}{f}\right)(3) = \frac{g(3)}{f(3)} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } f \circ g(1) &\Rightarrow g(1) = 1 \\ &\quad f(1) = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } g \circ f(1) &\quad f(1) = 4 \\ &\quad g(4) = 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } g \cdot f(-8) &\quad f(-8) = 5 \\ &\quad g(5) = 25 \end{aligned}$$

15. Sketch the graph of $f(x) = \sqrt{x-2} - 3$ by first sketching $g(x) = \sqrt{x}$ and then translating. (See Example 4.)



11. Find f and g so that $F = g \circ f$. (See Example 3.)

(a) $F(x) = \sqrt{x+7}$

(b) $F(x) = (x^2 + x)^{15}$

a)

$$f(x) = x + 7$$

$$g(x) = \sqrt{x}$$

$$g \circ f(x)$$


b)

$$f(x) = x^2 + x$$

$$g(x) = x^{15}$$

0.7

Trigonometric Functions



$$\sin t = \frac{a}{c}$$

$$\cos t = \frac{b}{c}$$

$$\tan t = \frac{a}{b}$$

$$\csc t = \frac{1}{\sin t}$$

$$\sec t = \frac{1}{\cos t}$$

$$\cot t = \frac{1}{\tan t}$$

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$$

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

$$\sin(-t) = -\sin(t) \quad \text{odd f.}$$

$$\cos(-t) = \cos t \quad \text{even f.}$$

$$\sin t = \sin(t + 2\pi)$$

$$\cos t = \cos(t + 2\pi)$$

EXAMPLE 5

Show that tangent is an odd function.

SOLUTION

$$\tan(-t) = \frac{\sin(-t)}{\cos(-t)} = \frac{-\sin t}{\cos t} = -\tan t$$

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$$

$$\tan(-t) = \frac{\sin(-t)}{\cos(-t)} = -\frac{\sin t}{\cos t} = -\tan t$$

odd function

EXAMPLE 6

Verify that the following are identities.

$$1 + \tan^2 t = \sec^2 t \quad 1 + \cot^2 t = \csc^2 t$$

$$a) \quad 1 + \tan^2 t = \sec^2 t$$

$$\cos^2 t \times 1 + \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} = \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos^2 t} = \frac{1}{\cos^2 t}$$

$$\text{نصف المتطابقة} = \sec^2 t$$

$$b) \quad 1 + \cot^2 t = \csc^2 t$$

$$\cot t = \frac{\cos t}{\sin t}$$

$$1 + \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t}$$

$$\frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\sin^2 t} = \frac{1}{\sin^2 t} = \csc^2 t$$

نصف المتطابقة

Then

$$\sin \theta = \frac{y}{r}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r}$$

List of Important Identities We will not take space to verify all the following identities. We simply assert their truth and suggest that most of them will be needed somewhere in this book.

Trigonometric Identities The following are true for all x and y , provided that both sides are defined at the chosen x and y .

Odd-even identities

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\tan(-x) = -\tan x$$

Cofunction identities

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$$

Pythagorean identities

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Addition identities

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

Double-angle identities

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\begin{aligned}\cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= 2 \cos^2 x - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2 x\end{aligned}$$

Half-angle identities

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$$

Sum identities

$$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right)$$

Product identities

$$\sin x \sin y = -\frac{1}{2}[\cos(x + y) - \cos(x - y)]$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x + y) + \cos(x - y)]$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x + y) + \sin(x - y)]$$

Problem Set 0.7

9. Evaluate without using a calculator.

(a) $\tan \frac{\pi}{6}$


(b) $\sec \pi$

(c) $\sec \frac{3\pi}{4}$

(d) $\csc \frac{\pi}{2}$

(e) $\cot \frac{\pi}{4}$

(f) $\tan \left(-\frac{\pi}{4} \right)$



t	$\sin t$	$\cos t$
0	0	1
$\pi/6$ 30	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
$\pi/4$ 45	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
$\pi/3$ 60	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
$\pi/2$	1	0
$2\pi/3$ 120	$\sqrt{3}/2$	$-1/2$
$3\pi/4$ 135	$\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$
$5\pi/6$ 150	$1/2$	$-\sqrt{3}/2$
π	0	-1

$$a) \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{\cos \frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$b) \sec(\pi) = \frac{1}{\cos \pi} = \frac{1}{-1} = -1 \quad 2 = \sqrt{2}\sqrt{2}$$

$$c) \sec \frac{3\pi}{4} = \frac{1}{\cos(\frac{3\pi}{4})} = \frac{1}{-\frac{\sqrt{2}}{2}} = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

$$d) \csc \frac{\pi}{2} = \frac{1}{\sin(\frac{\pi}{2})} = \frac{1}{1} = 1$$

$$e) \cot\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\cos \frac{\pi}{4}}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1$$

$$f) \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\tan \frac{\pi}{4} = -\frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\cos \frac{\pi}{4}} = -1$$

11. Verify that the following are identities (see Example 6).

$$(a) (1 + \sin z)(1 - \sin z) = \frac{1}{\sec^2 z}$$

$$(b) (\sec t - 1)(\sec t + 1) = \tan^2 t$$

$$(c) \sec t - \sin t \tan t = \cos t$$

$$(d) \frac{\sec^2 t - 1}{\sec^2 t} = \sin^2 t$$

$$(a+b)(a-b)$$

$$a) (1 + \sin z)(1 - \sin z) = \frac{1}{\sec^2 z}$$

$$= 1 - \sin^2 z$$

$$= \cos^2 z$$

$$= \frac{1}{\sec^2 z}$$

$$\cos^2 z + \sin^2 z = 1$$

$$\cos^2 z = 1 - \sin^2 z$$

$$\sin^2 z = 1 - \cos^2 z$$

$$b) (\sec t - 1)(\sec t + 1) = \tan^2 t$$

$$= \sec^2 t - 1$$

$$= \tan^2 t$$



$$c) \sec t - \sin t \tan t = \cos t$$

$$\frac{1}{\cos t} - \sin t \frac{\sin t}{\cos t}$$

$$\frac{1}{\cos t} - \frac{\sin^2 t}{\cos t}$$

$$\frac{1 - \sin^2 t}{\cos t} = \frac{\cos^2 t}{\cos t} = \cos t$$

$$d) \frac{\sec^2 t - 1}{\sec^2 t} = \sin^2 t$$

$$\frac{\tan^2}{\sec^2 t} = \frac{\frac{\sin^2 t}{\cancel{\cos^2 t}}}{\frac{1}{\cancel{\cos^2 t}}} = \sin^2 t$$

Find the exact values in Problems 27–31. Hint: Half-angle identities may be helpful.

27. $\cos^2 \frac{\pi}{3}$

28. $\sin^2 \frac{\pi}{6}$

29. $\sin^3 \frac{\pi}{6}$

30. $\cos^2 \frac{\pi}{12}$

$$27) \left(\cos \frac{\pi}{3} \right)^2 = \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$29) \left(\sin \frac{\pi}{6} \right)^3 = \left(\frac{1}{2} \right)^3 = \frac{1}{8}$$


CHAPTER

1

Limits

1.1

Introduction to Limits



عندما x تقترب من 2
تقترب $f(x)$ من 5

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$$

نكتب النهاية بالتعريف الجاهزة
في الدالة

$$f(x) = 3x - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 1) = 8$$

$$y = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$$



$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \frac{1 - 1}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)}$$

$$1 + 1 + 1 = 3$$

x	$y = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$
1.25	3.813
1.1	3.310
1.01	3.030
1.001	3.003
1.000	3
0.999	2.997
0.99	2.970
0.9	2.710
0.75	2.313

Table of values



$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

$$f(x) = L$$

إذا أنتج من تقويم العبارة عدد L
فانه يادي قيمه النهائيه لكن اذا كانت الاطراف $\frac{0}{0}$
فان النهايه تحتاج التحليل

EXAMPLE 1 Find $\lim_{x \rightarrow 3} (4x - 5) = 4(3) - 5 = 7$

EXAMPLE 2 Find $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$.

نفوض تقويم مباشر

$$\frac{(3)^2 - 3 - 6}{3 - 3} = \frac{0}{0}$$

لا ينفع تقويم مباشر
يجب تحليل الداله
للتخلص من صفم

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 2)}{(x - 3)}$$


الان نفوض

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x - 2) = 1$$

EXAMPLE 5 (No limit at a jump) Find $\lim_{x \rightarrow 2} [x]$.

SOLUTION Recall that $[x]$ denotes the greatest integer less than or equal to x (see Section 0.5). The graph of $y = [x]$ is shown in Figure 7. For all numbers x less than 2 but near 2, $[x] = 1$, but for all numbers x greater than 2 but near 2, $[x] = 2$. Is $[x]$ near a single number L when x is near 2? No. No matter what number we propose for L , there will be x 's arbitrarily close to 2 on one side or the other, where $[x]$ differs from L by at least $\frac{1}{2}$. Our conclusion is that $\lim_{x \rightarrow 2} [x]$ does not exist. If you check back, you will see that we have not claimed that every limit we can write must exist. ■

دالة متقطع



$$f(x) = [x] = [2] = 2$$


$$[3.1] = 3$$

$$[2.9] = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \text{not exist}$$



left hand limit

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4$$

Right hand limit

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \text{not exist}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$$

إذا لم يتساوى النهايتان إذا النهايتان غير متساويتين
إذا تساوت النهايتان فان النهاية موجودة

Problem Set 1.1

In Problems 1–6, find the indicated limit.

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (x - 5)$

2. $\lim_{t \rightarrow -1} (1 - 2t)$

3. $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + 2x - 1)$

4. $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + 2t - 1)$

5. $\lim_{t \rightarrow -1} (t^2 - 1)$

6. $\lim_{t \rightarrow -1} (t^2 - x^2)$

1) $\lim_{x \rightarrow 3} (x - 5) = 3 - 5 = -2$

3) $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + 2x - 1)$
 $= (-2)^2 + 2(-2) - 1 = -1$

In Problems 7–18, find the indicated limit. In most cases, it will be wise to do some algebra first (see Example 2).

7. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

8. $\lim_{t \rightarrow -7} \frac{t^2 + 4t - 21}{t + 7}$

9. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{x + 1}$

10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + 2x^3 - x^2}{x^2}$

11. $\lim_{x \rightarrow -t} \frac{x^2 - t^2}{x + t}$

12. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

7) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{0}{0}$

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(\cancel{x-2})}{\cancel{x-2}}$

$\lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$

8) $\lim_{t \rightarrow -7} \frac{t^2 + 4t - 21}{t + 7} = \frac{49 - 28 - 21}{-7 + 7} = \frac{0}{0}$

$\lim_{t \rightarrow -7} \frac{(t+7)(\cancel{t-3})}{\cancel{t+7}} = \lim_{t \rightarrow -7} (t-3) = -10$

11) $\lim_{x \rightarrow -t} \frac{x^2 - t^2}{x + t} = \frac{0}{0}$

$\lim_{x \rightarrow -t} \frac{(x+t)(\cancel{x-t})}{\cancel{x+t}} = \lim_{x \rightarrow -t} x - t = -t - t = -2t$

43. Find each of the following limits or state that it does not exist.

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x-1}$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x-1} = \frac{|0-1|}{0-1} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x-1|}{x-1} = \frac{|2-1|}{2-1} = \frac{1}{1} = +1$$

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$ does not exist

b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x-1} = -1$

1.3

Limit Theorems

Theorem A Main Limit Theorem

Let n be a positive integer, k be a constant, and f and g be functions that have limits at c . Then

1. $\lim_{x \rightarrow c} k = k$; $\lim_{x \rightarrow 2} 5 = 5$
2. $\lim_{x \rightarrow c} x = c$; $\lim_{x \rightarrow 2} x = 2$
3. $\lim_{x \rightarrow c} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow c} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 3} 5x = 5 \lim_{x \rightarrow 3} x = 15$
4. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x)$;
5. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x)$;
6. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x)$; $\lim_{x \rightarrow 3} p(x) + q(x) = \lim_{x \rightarrow 3} p(x) + \lim_{x \rightarrow 3} q(x)$
7. $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}$, provided $\lim_{x \rightarrow c} g(x) \neq 0$;
8. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow c} f(x)]^n$; $\lim_{x \rightarrow 2} (2x+4)^5 = (\lim_{x \rightarrow 2} 2x+4)^5$
9. $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}$, provided $\lim_{x \rightarrow c} f(x) > 0$ when n is even.

EXAMPLE 1

Find $\lim_{x \rightarrow 3} 2x^4$.

$$2 \lim_{x \rightarrow 3} x^4 = 2(3)^4 = 162$$

EXAMPLE 2 Find $\lim_{x \rightarrow 4} (3x^2 - 2x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 4} 3x^2 - \lim_{x \rightarrow 4} 2x$$

$$3(4)^2 - 2(4) = 48 - 8 = 40$$

EXAMPLE 3 Find $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{x}$.

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x^2 + 9}}{\lim_{x \rightarrow 4} x} = \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 4} (x^2 + 9)}}{\lim_{x \rightarrow 4} x}$$

$$\frac{\sqrt{16 + 9}}{4} = \frac{5}{4}$$

EXAMPLE 4 If $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 4$ and $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 8$, find

$$\lim_{x \rightarrow 3} [f^2(x) \cdot \sqrt[3]{g(x)}]$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f^2(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt[3]{g(x)}$$

$$\left(\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \right)^2 \cdot \sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow 3} g(x)}$$

$$(4)^2 \cdot \sqrt[3]{8}$$

$$16 \cdot 2 = 32$$

EXAMPLE 5

Find $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{7x^5 - 10x^4 - 13x + 6}{3x^2 - 6x - 8}$.

$$\frac{7(2)^5 - 10(2)^4 - 13(2) + 6}{3(2)^2 - 6(2) - 8}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 32 \\ \hline 224 \end{array}$$

$$\frac{7(32) - 10(16) - 13(2) + 6}{12 - 12 - 8} = \frac{.44}{-8} = \frac{-11}{2}$$

$$\begin{array}{r} 224 \\ 180 \\ \hline 44 \end{array}$$

$$(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$$

$$(A \pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2$$

$$A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$$

EXAMPLE 6

Find $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 3x + 7}{x^2 - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 3x + 7}{(x-1)^2}$.

$$\frac{(1)^3 + 3(1) + 7}{1^2 - 2(1) + 1} = \frac{1 + 3 + 7}{1 - 2 + 1} = \frac{11}{0}$$

النهاية غير موصورة

EXAMPLE 7

Find $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \frac{1-1}{\sqrt{1}-1} = \frac{0}{0}$ ✓

بجبه صفرية
التقسيد

نقوم بالتقسيد و التكاميم بمرافقة الحقام

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x-1)}(\sqrt{x}+1)}{\cancel{x-1}} = 2$$

EXAMPLE 8Find $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 + x - 6}$.

$$= \frac{4 + 6 - 10}{4 + 2 - 6} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 5)}{(x - 2)(x + 3)} = \frac{7}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Squeeze theorem

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad f(x) < g(x) < h(x) \quad \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

EXAMPLE 9Assume that we have proved $1 - x^2/6 \leq (\sin x)/x \leq 1$ for all x near but different from 0. What can we conclude about $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$?

$$\frac{1 - x^2}{6} \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^2}{6} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Problem Set 1.3

In Problems 1–12, use Theorem A to find each of the limits. Justify each step by appealing to a numbered statement, as in Examples 1–4.

1. $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 1)$

2. $\lim_{x \rightarrow -1} (3x^2 - 1)$

$$\lim_{x \rightarrow 1} 2x + \lim_{x \rightarrow 1} 1 = 2(1) + 1 = 3$$

5. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x + 1}{5 - 3x}$

6. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{4x^3 + 1}{7 - 2x^2}$

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 2} 2x + 1}{\lim_{x \rightarrow 2} 5 - 3x} = \frac{2(2) + 1}{5 - 3(2)} = \frac{5}{-1} = -5$$

9. $\lim_{t \rightarrow -2} (2t^3 + 15)^{13}$

10. $\lim_{w \rightarrow -2} \sqrt{-3w^3 + 7w^2}$

$$\begin{aligned} \left(\lim_{t \rightarrow -2} 2t^3 + 15 \right)^{13} &= \left[2(-2)^3 + 15 \right]^{13} = [-16 + 15]^{13} \\ &= [-1]^{13} = -1 \end{aligned}$$

In Problems 13–24, find the indicated limit or state that it does not exist. In many cases, you will want to do some algebra before trying to evaluate the limit.

13. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4}$

14. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$

$\frac{0}{0}$ $\frac{1/2}{0}$

15. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1}$

16. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + x}{x^2 + 1}$

13) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^2 - 4}{2^2 + 4} = \frac{0}{8} = 0$

15) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1} = \frac{(-1)^2 - 2(-1) - 3}{-1 + 1} = \frac{0}{0}$

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x - 3)(\cancel{x + 1})}{(\cancel{x + 1})} = (-1 - 3) = -4$

-pva

19. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$

20. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 14x - 51}{x^2 - 4x - 21}$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1} = \frac{1^2 + 1 - 2}{1^2 - 1} = \frac{0}{0}$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 2)(\cancel{x - 1})}{(x + 1)(\cancel{x - 1})} = \frac{3}{2}$

In Problems 25–30, find the limits if $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 3$ and

$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -1$ (see Example 4).

25. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{f^2(x) + g^2(x)}$

26. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{2f(x) - 3g(x)}{f(x) + g(x)}$

27. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{g(x)} [f(x) + 3]$

28. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - 3]^4$

$$\sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} \cdot \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} 3 \right]$$

$\{$

$$-1 \cdot [3 + 3] = -6$$

1.4

Limits Involving Trigonometric Functions

Sin	
Cos	sec
Tan	csc

لنقوم بالتعويض
العبارة وازا
كانت الاجابة
صفر او
غير متناهية

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sin \frac{\pi}{x}$$

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1$$

لنقوم بالتعويض
العبارة والنتيجة

$$\frac{0}{0}$$

يجب تحليل لداالة
حتى نتخلص من الصفر
القام كمن نقوم
واذا لم ينتج في النهاية
غير موجودة

حقيقة

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t} = 0$$

النهاية الحكيمة الخاصة

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{t} = 3$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{3t} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{4t} = \frac{3}{4}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t}{t} = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan 5t}{t} = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\tan 4x} = \frac{5}{4}$$

EXAMPLE 1Find $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 \cos t}{t + 1}$.

$$= \frac{0^2 \cos(0)}{0 + 1} = \frac{0}{1} = 0$$

EXAMPLE 2

Find each limit.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$

(b) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{\sin t}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\tan x}$

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \frac{\sin 3x}{3x}$$

$$3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} = 3 \cdot 1 = 3$$

$$b) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{\sin t} =$$

نقطة البسط
والقام
على 0

$$\frac{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t}}{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t}} = \frac{0}{1} = 0$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\tan x} =$$

نسبة البسط والقام
على 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 4x}{x}}{\frac{\tan x}{x}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \cdot \frac{\sin 4x}{4x}}{1 \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x}} = \frac{4 \cdot 1}{1 \cdot 1} = 4$$

Problem Set 1.4

In Problems 1–14, evaluate each limit.

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x + 1} = \frac{\cos 0}{0 + 1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$3. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos^2 t}{1 + \sin t} = \frac{\cos^2 0}{1 + \sin 0} = \frac{1}{1} = 1$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x}}{\frac{2x}{x}} = \frac{1}{2}$$

$$7. \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin 3\theta}{\tan \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 3\theta}{3\theta}}{\frac{\tan \theta}{\theta}} = \frac{3 \cdot 1}{1} = 3$$

$$9. \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cot(\pi\theta) \sin \theta}{2 \sec \theta} \quad (9) = \frac{\frac{\cos \pi\theta}{\sin \pi\theta} \sin \theta}{\frac{2}{\cos \theta}}$$

$$11. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan^2 3t}{2t} = \frac{\frac{\cos \pi\theta}{2 \sin \pi\theta} \sin \theta \cos \theta}{2t}$$

$$13. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t + 4t}{t \sec t} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \pi\theta}{2\pi} \cos \theta = \frac{1 \cdot 1}{2\pi} = 2\pi$$

$$(11) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3t}{2t \cos^2 3t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3t}{2t} \cdot \frac{1}{\cos^2 3t}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3t}{3t} \cdot \frac{1}{\cos^2 3t}$$

$$\frac{0}{1} = 0$$

$$(13) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t + 4t}{t \sec t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{t \sec t} + \frac{4t}{t \sec t}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3t}{3t} \cdot \cos t + 4 \cos t \right)$$

$$3 + 4 = 7$$

$$8. \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\tan 5\theta}{\sin 2\theta}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\frac{\tan 5\theta}{\theta}}{\frac{\sin 2\theta}{\theta}} = \frac{5}{2}$$

$$14. \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \theta}{\theta^2}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \cdot \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \cdot 1 = 1$$


1.5

Limits at Infinity; Infinite Limits

$$\lim_{x \rightarrow \infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$



$$x \rightarrow \infty \quad \frac{\text{سطح}}{\text{مقام}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty}$$

$$\frac{\text{سطح}}{\text{مقام}}$$

درجه سطح اكبر من مقام اذا النهاية $\infty =$
 درجه سطح اعظم درجه مقام اذا
 النهاية صفر
 اذا مساوت درجه سطح مع
 درجه المقام تكون النهاية = $\frac{\text{مقابل سطح}}{\text{مقابل مقام}}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 + 2x}{x^3 + 1} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 1}{x^5 + 2x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^5 + 4}{3x^5 - 2} = \frac{2}{3}$$

EXAMPLE 1Show that if k is a positive integer, then

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^k} = 0 \text{ and } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^k} = 0$$

$$\frac{1}{\infty} = 0$$

$$\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}, \frac{1}{x^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^k} = \frac{1}{x^4} = \frac{1}{\infty^4} = 0$$

EXAMPLE 2Prove that $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^2} = 0$.

کتاب الیہ کے تحت $x \rightarrow \infty$ لے کر آکر
 کا ایک ہے

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{x^2}}{\frac{1}{x^2} + \frac{x^2}{x^2}} = \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2} + 1}$$

$$= \frac{\frac{1}{\infty}}{\frac{1}{\infty^2} + 1} = \frac{0}{0+1} = 0$$

zer

EXAMPLE 3Find $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3}{1+x^3}$.


نقشہ الیہ
 x^3 سے

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2x^3}{x^3}}{\frac{1}{x^3} + \frac{x^3}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{\frac{1}{x^3} + 1}$$

$$= \frac{2}{\frac{1}{-\infty} + 1} = 2$$

EXAMPLE 5Find $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{(x-1)^2}$ and $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{(x-1)^2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{1}{0} = \text{النسبة غير موجودة}$$



$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{1}{0.001} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{(0.999-1)^2} = \frac{1}{0} = \infty$$

EXAMPLE 6Find $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x^2-5x+6}$.

$x \rightarrow 2$
 $= \frac{3}{4-10+6} = \frac{3}{0}$
 النسبة غير موجودة
 $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{(x-3)(x-2)} = -\frac{2}{0} = \infty$$

Asymptote

خط التقارب

horizontal

خط تقارب افقي




معرف خط افقي يقترب
منه الى ما لا
تناه

خط تقارب افقي عند $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

vertical

خط التقارب العمودي



خط التقارب العمودي يقع عند اصفاء الحسام (C)
ويعرف القامه التالي


$$\lim_{x \rightarrow C^+} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow C^-} f(x) = \infty$$

EXAMPLE 7

Find the vertical and horizontal asymptotes of the graph of $y = f(x)$ if

$$f(x) = \frac{2x}{x-1}$$



$$x=1$$

$$x-1=0$$

العمودي


$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x}{x-1} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x}{x-1} = \infty$$

خط المقارب العمودي


$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x}{x}}{\frac{x}{x} - \frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{1 + \frac{1}{x}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\frac{2}{1 + \frac{1}{\infty}} \text{ zero} \\ &= 2\end{aligned}$$




1.6


Continuity of Functions



النهاية غير موجودة
غير متصل



النهاية موجودة
 $f(c) \neq \lim_{x \rightarrow c}$
غير متصل



له نهاية متصل

خاصية شروط الاتصال عند النقطة

① الدالة حرة عند c $f(c)$ موجودة

$f(c) = -$

② النهاية موجودة

$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -$

③ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

إذا تحقق الشرط
 $f(x)$ is continuous at $x=c$

EXAMPLE 1 Let $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$, $x \neq 2$. How should f be defined at $x = 2$ in order to make it continuous there?

نقطة تعريف 2 في الدالة

نعم يجب ان تكونه منتهية $f(2)$ حتى تصبح

الدالة متصلة عند 2

① $f(2) = 4$?? $= f(2)$

② $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2} = 4$

③

$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

$4 = 4$

② removable discontinuity

يجب ان يكونه
نكونه الدالة متصلة
 $f(2) = 4$

$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & x \neq 2 \\ 4 & x = 2 \end{cases}$
هذه الدالة متصلة

① جميع كثيرات الحدود متصلة على جميع الأعداد

$f(x) = x^2 + 2x + 5$

② دوال الجذور الذائبة
متصلة فقط على $x \geq 0$

③ دوال القيمة المطلقة $|x|$ متصلة على جميع الأعداد

④ الدوال الكسرية غير متصلة عند أصفاء المقام $\frac{1}{x-1}$

⑤ دالة مجموع أو ضرب أو قسمته $f+g$ $f \cdot g$ $\frac{f}{g}$

EXAMPLE 2

At what numbers is $F(x) = (3|x| - x^2)/(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})$

continuous?

$$F(x) = \frac{3|x| - x^2}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$$



$|x|$ and x^2 $\sqrt[3]{x} \Rightarrow$ منطوقی کد، لا عدد

$\sqrt{x} \Rightarrow$ منطوقی کد، لا عدد

The function $F(x)$ continuous at All Positive numbers

EXAMPLE 3

Determine all points of discontinuity of $f(x) = \frac{\sin x}{x(1-x)}$,

$x \neq 0, 1$. Classify each point of discontinuity as removable or nonremovable.

نبتة نبراجار الحقام للمعدل كد نقاط الانقطاع

$$x(1-x) = 0$$

$$x = 0$$

$$1-x = 0$$

$$x = 1$$

الدالة متصلة عند جميع الأعداد حاصلة $x=1$ $x=0$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin x}{x(1-x)} = \frac{\text{نقطة}}{\text{صفر}} = \text{the limit is not exist}$
non removable discontinuity

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x(1-x)} = \frac{0}{0}$ كد، لا تقبل

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1-x} = 1$ المتناهي محدود
removable continuous

$$h(x) = f(g(x)) = f \circ g(x)$$

إذا كانت g متصلة و f متصلة إذا التركيب تكون متصلة

EXAMPLE 4 Show that $h(x) = |x^2 - 3x + 6|$ is continuous at each real number.

$$g(x) = x^2 - 3x + 6 \quad \text{متصلة في جميع الأعداد}$$

$$f(x) = |x| \quad \text{متصلة في جميع الأعداد}$$

$$h(x) = f(g(x)) \quad \text{متصلة في جميع الأعداد}$$

EXAMPLE 5 Show that $h(x) = \sin \frac{x^4 - 3x + 1}{x^2 - x - 6}$ is continuous except at $3, -2$

$$h(x) = \sin \frac{x^4 - 3x + 1}{x^2 - x - 6}$$

$$g(x) = \frac{x^4 - 3x + 1}{x^2 - x - 6}$$

$$f(x) = \sin x$$

متصلة

$$h(x) = f \circ g(x)$$



$\sin x$ متصلة إذا ثبت في مقال $g(x)$

$g(x)$ دالة كسرية إذا ثبت عند صفاء المقام

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x - 3)(x + 2) = 0$$

$$x - 3 = 0 \quad x = 3$$

$$x + 2 = 0 \quad x = -2$$

دالة g متصلة عند جميع الأعداد ما عدا $-2, 3$

EXAMPLE 6 Using the definition above, describe the continuity properties of the function whose graph is sketched in Figure 7.


فترات الاتصال

$(-\infty, 0)$

$(0, 3)$

$[3, 5]$

$(5, \infty)$



EXAMPLE 7 What is the largest interval over which the function defined by $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$ is continuous?

نبحث عن الفترات المتصلة حيث الجذر موجب

$$4 - x^2 \geq 0$$

$$4 \geq x^2$$

فترته الحجاز

$$\pm 2 \geq |x|$$

$$[-2, +2]$$



$$g(x) = \sqrt{4 - x^2} =$$

لتحديد الاتصال عند فترته

١- الفتره محبها فمن الحجاز

٢- النهايه موجوده عند الاطراف (الوافاق لاقل لنرسم النهايه من اليمين والوافاق الاكبر لنرسم النهايه من اليسار



$$\lim_{x \rightarrow a^+}$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-(-2)^2} \approx 0$$

$$\approx -1.9$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-4} = 0$$

النقطة موجودة و النهاية موجودة على الفترة

الانحناء صحيح في $(-2, 2)$

Problem Set 1.6

In Problems 1–15, state whether the indicated function is continuous at 3. If it is not continuous, tell why.

1. $f(x) = (x - 3)(x - 4)$ 2. $g(x) = x^2 - 9$

① $f(3) = (3-3)(3-4) = 0$

② $\lim_{x \rightarrow 3} (x-3)(x-4) = 0$

③ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ Continuous

9. $h(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

① $f(3) = \frac{3^2 - 9}{3 - 0} = \frac{0}{0}$

$f(x)$ is not continuous at $x=3$
because $f(x)$ is not exist

$$11. r(t) = \begin{cases} \frac{t^3 - 27}{t - 3} & \text{if } t \neq 3 \\ 27 & \text{if } t = 3 \end{cases}$$

$$(A^3 - B^3)$$

$$= (A - B)(A^2 + AB + B^2)$$

$$① f(3) = 27$$

$$② \lim_{t \rightarrow 3} \frac{t^3 - 3^3}{t - 3} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{t \rightarrow 3} \frac{(t - 3)(t^2 + 3t + 9)}{t - 3} = 9 + 9 + 9 = 27$$

$$③ f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \quad \text{continuous}$$

$$27 = 27$$

$$13. f(t) = \begin{cases} t - 3 & \text{if } t \leq 3 \\ 3 - t & \text{if } t > 3 \end{cases}$$

$$① f(3) = 0 \quad \checkmark$$

$$② \lim_{t \rightarrow 3^+} 3 - t = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 3^-} t - 3 = 0$$

continuous


$$③ \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$$

$$0 = 0$$

In Problems 24–35, at what points, if any, are the functions discontinuous?

27. $r(\theta) = \tan \theta$

$$\frac{\pi}{2} + 2\pi n$$



31. $G(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$


الجذر حاداض الجذر ١ كيف من صر

$$4 - x^2 \geq 0 \quad 4 \geq x^2 \quad \pm 2 \geq |x|$$

$$\sqrt{4-x^2} = 0 \quad 4-x^2 = 0 \quad \sqrt{4} = \sqrt{x^2}$$

$$\pm 2 \quad \text{و} \quad \pm 2 \quad x = \pm 2$$

مرف حفظ في صر، لفر



$$(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$$